සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.

රහස්‍ය ලේඛනයකි.



ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2024

02 - රසායන විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

මෙය උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන/ සහකාර පරීක්ෂක රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතුව ඇත.

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2024

02 - රසායන විද්‍යාව

ලකුණු බෙදී යාමේ ආකාරය

I පත්‍රය : 1 X 50 = 50

II පත්‍රය :

A කොටස : 100 X 4 = 400

B කොටස : 150 X 2 = 300

C කොටස : 150 X 2 = 300

එකතුව = 1000

II පත්‍රය – අවසාන ලකුණු = 100

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ශිල්පීය ක්‍රම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය අනුගමනය කිරී අනිවාර්යයෙන් ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බෝල් පොයින්ට් පෑනක් පාවිච්චි කරන්න.

2. සෑම උත්තරපත්‍රයකම මුල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න.

   ඉලක්කම් ලිවීමේදී **පැහැදිලි ඉලක්කමෙන්** ලියන්න.

3. ඉලක්කම් ලිවීමේදී වැරදුණු අවස්ථාවක් වේ නම් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවැ

   ලියා කෙටි අත්සන යොදන්න.

4. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ ∠ ක් තුළ ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයත් සමඟ □ ක් තුළ, භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙ ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඇති තීරු භාවිත කරන්න.

උදාහරණ : ප්‍රශ්න අංක 03

(i) ..... √ $\frac{4}{5}$

....

(ii) ..... √ $\frac{3}{5}$

....

(iii) ..... √ $\frac{3}{5}$

....

03 $\frac{4}{5}$ + (ii) $\frac{3}{5}$ + (iii) $\frac{3}{5}$ = $\frac{10}{15}$

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර : (කවුළු පත්‍රය)

1. අ.පොෂ. (උ.පෙළ) හා තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය සඳහා කවුළු පත්‍ර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සකසා ලැබේ. නිවැරදි වරණ කපා ඉවත් කළ සහතික කරන ලද කවුළුපතක් ඔබ වෙත සපයනු ලැබේ. සහතික කළ කවුළු පත්‍රයක් භාවිත කිරීම පරීක්ෂකගේ වගකීම වේ.

2. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු ක ඇත්නම් හෝ එකම පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්නම් හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අදින්න. ඇතැ විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබෙන්න පුළුවන. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අදින්න

3. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර 0 ලකුණකි ද වරණ මත ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න. අනතුරු එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇඳ කපා හරින්න. වැරදි හෝ නුසුදුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි අඳින්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.

2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඕවර්ලන්ඩ් කඩදාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.

3. සෑම ප්‍රශ්නයකටම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.

4. පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සෑම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ. එබැවින් එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතු ය. I පත්‍රය සඳහා බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රයක් පමණක් ඇති විට ලකුණු ලැයිස්තුවට ලකුණු ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු අකුරෙන් ලියන්න. අනෙකුත් උත්තරපත්‍ර සඳහා විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.

***

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Examinations – Sri Lanka
අ.පොස.(උ.පෙළ)විභාගය/G.C.E. (A/L) - 2024

විෂයය අංකය Subject No: 02

විෂයය Subject: රසායන විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය/Marking Scheme
I පත්‍රය/Paper I

ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.	ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.	ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.	ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.	ප්‍රශ්න අංකය Question No.	පිළිතුරු අංකය Answer No.
01.	5	11.	3	21.	4	31.	4/5	41.	1
02.	2	12.	2	22.	3	32.	5	42.	1
03.	4	13.	3	23.	4	33.	3	43.	1
04.	4	14.	1	24.	1	34.	3	44.	1
05.	2	15.	3	25.	1	35.	3	45.	2
06.	4	16.	2	26.	4	36.	4	46.	3
07.	5	17.	4	27.	2	37.	5	47.	4
08.	3	18.	5	28.	5	38.	1	48.	3
09.	3	19.	5	29.	(all)	39.	2	49.	1
10.	5	20.	2	30.	5	40.	2	50.	1

✪ විශේෂ උපදෙස්/Special Instructions:

එක් පිළිතුරකට ලකුණු 01 බැගින්/ 01 Mark for each question

මුළු ලකුණු/Total Marks 01 × 50 = 50

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

ප්‍රශ්න **හතරටම** මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි.)

1. (*a*) පහත සඳහන් ප්‍රකාශ **සත්‍ය** ද නැතහොත් **අසත්‍ය** ද යන බව තීන්ත ඉරි මත සඳහන් කරන්න. හේතු අවශ්‍ය **නැත.**

(i) කැතෝඩ කිරණ සහ β කිරණ යන දෙකෙහිම අංශුවල ආරෝපණය සහ ස්කන්ධය අතර අනුපාතය (e/m) එකම වේ. ..... සත්‍ය .....

(ii) කොපර් (Cu) පරමාණුවක චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය $m_l = -1$ වන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 ක් ඇත. ..... සත්‍ය .....

(iii) F_2ClO^+ අයනයට තලීය ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් ඇත. ..... අසත්‍ය .....

(iv) F, S සහ Cl මූලද්‍රව්‍ය අතුරෙන් සල්ෆර් (S) වලට **අඩුම** පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇත. ..... සත්‍ය .....

(v) කැටායනවල ධ්‍රැවීකරණ බලය සහ ඇනායනවල ධ්‍රැවණශීලතාව හා සම්බන්ධ නීති, KF වලට වඩා LiCl වල ද්‍රවාංකය **ඉහළ** බව ප්‍රරෝකථනය කරයි. ..... අසත්‍ය .....

(vi) නයිට්‍රස් අම්ලය (HNO_2) හි, N — O බන්ධන දෙක දිගින් සමාන ය. ..... අසත්‍ය .....


(vii) CN_2^{2-} අයනය සඳහා ඇඳිය හැකි ලුවිස් තීන්ත-ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) සංඛ්‍යාව 3 කි. ..... සත්‍ය .....

(viii) හෙක්සේන් (hexane) වල තාපාංකය 2, 2-ඩයිමීතයිල්බියුටේන් (2, 2-dimethylbutane) හි එම අගයට වඩා **ඉහළ** ය. ..... සත්‍ය .....

(ලකුණු 04 X 8 = ලකුණු 32)

1(a): ලකුණු 32

(*b*) (i) ISO_4F අණුව සඳහා **වඩාත්ම** පිළිගත හැකි ලුවිස් තීන්ත-ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න. එහි සෑකිල්ල පහත දක්වා ඇත.




(ලකුණු 06)

(ii) ඉහත (i) හි අඳින ලද ව්‍යුහයේ S සහ I පරමාණුවල ඔක්සිකරණ අංක දෙන්න.

S ..... +5 හෝ +V ..... , I ..... +4 හෝ +IV ..... **(01) + (01)**

(i) කොටස නිවැරදි නම් පමණක් (ii) කොටසට ලකුණු දෙන්න.


(iii) HNCO අණුව සඳහා පිළිගත හැකි (ස්ථායී) ලුවිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහයක් පහත දී ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් ඇඳ ඒවායේ ස්ථායිතාවයන් දී ඇති ව්‍යුහයට සාපේක්ෂව දැක්වීමට එම ව්‍යුහ යටින් **ස්ථායී** හෝ **අඩු ස්ථායී** හෝ **අස්ථායී** වශයෙන් ලියන්න.



(අඩු ස්ථායී) (අස්ථායී)

(ව්‍යුහයට ලකුණු 02) + (ස්ථායිතාවයට ලකුණු 01)
(ලකුණු 06)

(iv) පහත සඳහන් ලුවිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය සහ එහි ලේබල් කරන ලද සැකිල්ල පදනම් කරගෙන දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



		N^1	N^2	N^3	N^4
I	පරමාණු වටා VSEPR යුගල් සංඛ්‍යාව	4	3	3	2
II	පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය	චතුස්තලීය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණ	රේඛීය
III	පරමාණුව වටා හැඩය	පිරමිඩීය/ ත්‍රි ආනති පිරමිඩීය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	කෝණික/ V හැඩැති	රේඛීය
IV	පරමාණුවේ මුහුම්කරණය	sp^3	sp^2	sp^2	sp

(ලකුණු 01 X 16 = ලකුණු16)

- කොටස් (v) සිට (viii), ඉහත (iv) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවිස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය මත පදනම් වේ. පරමාණු ලේබල් කිරීම (iv) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.

(v) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

I.	$H—N^1$	H ...1s...	N^1 ...sp^3...
II.	$N^1—N^2$	N^1 ...sp^3...	N^2 ...sp^2...
III.	$N^2—O$	N^2 ...sp^2...	O ...2p / sp^3...
IV.	$N^2—N^3$	N^2 ...sp^2...	N^3 ...sp^2...
V.	$N^3—N^4$	N^3 ...sp^2...	N^4 ...sp...
VI.	$N^4—C$	N^4 ...sp...	C ...2p / sp...

(ලකුණු 01 X 12 = ලකුණු12)

(vi) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

I.	$N^2—N^3$	N^2 ...2p...	N^3 ...2p...
II.	$N^4—C$	N^4 ...2p...	C ...2p...
		N^4 ...2p...	C ...2p...

(ලකුණු 01 X 6 = ලකුණු 06)

(vii) N^1, N^2, N^3 සහ N^4 පරමාණු වටා ආසන්න බන්ධන කෝණ සඳහන් කරන්න.

N^1 (107° ± 1) N^2 (120° ± 1) N^3 (117° ± 2) N^4 (180° ± 1) **(ලකුණු 01 X 4 = ලකුණු 04)**

(viii) N^1, N^2, N^3 සහ N^4 පරමාණු ඒවායේ විද්‍යුත් සෘණතාවයන් **වැඩිවන** පිළිවෙළට සකසන්න.

...N^1... < ...N^3... < ..N^2... < ..N^4... **(ලකුණු 04)**

1(b): ලකුණු 56

(c) වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය **වැඩිවන** පිළිවෙළට පහත සඳහන් විශේෂ සකසන්න. හේතු අවශ්‍ය **නැත.**

(i) B, O, F, S, Na, Mg (විද්‍යුත් සෘණතාව)

Na < Mg < B < S < O < F **(ලකුණු 06)**

(ii) K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, S^{2-} (අයනික අරය)

Al^{3+} < Mg^{2+} < Ca^{2+} < K^+ < Cl^- < S^{2-} **(ලකුණු 06)**

1(c): ලකුණු 12

2. (a) (i) I. **X** යනු තැඹිලි පැහැති අයනික සංයෝගයකි. එය 7:2:2 අනුපාතයෙන් ඇති මූලද්‍රව්‍ය තුනකින් සමන්විත වේ (රසායනික සූත්‍රය ලිවීමේ අනුපිළිවෙළට නොවේ). මේවායින් දෙකක්, ආවර්තිතා වගුවේ එකම ආවර්තයට අයත් ලෝහ වේ. මෙම ලෝහ දෙකෙන් එකක්, *s*-ගොනුවට අයත් වන අතර, අනෙක *d*-ගොනුවට අයත් වේ. *d*-ගොනුවේ ලෝහය විද්‍යුත් ලෝහාලේපනයේදී බහුලව භාවිත කරයි.

X හඳුනාගන්න. $K_2Cr_2O_7$

II. **Y** යනු බනිජ අම්ලයකි. එය 1:2:4 අනුපාතයෙන් ඇති මූලද්‍රව්‍ය තුනකින් සමන්විත වේ (රසායනික සූත්‍රය ලිවීමේ අනුපිළිවෙළට නොවේ). **Y** හි ඇති එක් මූලද්‍රව්‍යයක් **X** හි ද අඩංගු වේ. පොස්පේට් පොහොර නිපදවීම සඳහා **Y** භාවිත වේ.

Y හඳුනාගන්න. H_2SO_4

III. **Z** යනු කටුක ගඳක් ඇති ත්‍රි-පරමාණුක වායුවකි. එයට V-හැඩයක් ඇත. එය **Y** නිෂ්පාදනයේදී භාවිත වේ.

Z හඳුනාගන්න. SO_2 **(ලකුණු 06 x 3 = ලකුණු 18)**

(ii) **X** හි අඩංගු ලෝහ දෙකෙහි ඔක්සිකරණ අංක හා ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාස ලියන්න.

ලෝහය K ඔක්සිකරණ අංකය +I ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය $1s^22s^22p^63s^23p^6$ හෝ $1s^22s^22p^63s^23p^63p^64s^1$

ලෝහය Cr ඔක්සිකරණ අංකය +VI ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය $1s^22s^22p^63s^23p^6$ හෝ $1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1$

(ලකුණු 02 x 6 = ලකුණු 12)

(iii) I. **Z** උපයෝගී කොට **Y** නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලිය නම් කරන්න. **(ලකුණු 02)**

ස්පර්ශ ක්‍රමය .....

II. **Z**, $O_2(g)$ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර සෑදෙන වායුව **Y** වල සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක දිය කළ විට **P** සංයෝගය ලබා දේ. **P** සංයෝගය ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ විට නැවත **Y** ලබා දේ. **P** සංයෝගයේ නම සහ රසායනික සූත්‍රය ලියන්න.

නම ඔලියම්/ පයිරොසල්ෆියුරික් අම්ලය / සඩුම සල්ෆියුරික් අම්ලය / ඩයිසල්ෆියුරික් අම්ලය ..... රසායනික සූත්‍රය **(P)** $H_2S_2O_7$ .....

(ලකුණු 04 x 2 = ලකුණු 08)

(iv) **X**, **Y** හා **Z** එකට ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න.

$K_2Cr_2O_7(aq) + H_2SO_4(aq) + 3SO_2(g) \rightarrow K_2SO_4(aq) + Cr_2(SO_4)_3(aq) + H_2O(l)$ .....

(ලකුණු 10)

හෝ

$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 3SO_2(g) + 2H^+(aq) \rightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 3SO_4^{2-}(aq) + H_2O(l)$ **(ලකුණු 06)**

භෞතික අවස්ථා අවශ්‍ය නැත.

2(a): ලකුණු 50

(*b*) $BaCl_2$, NaI, $Pb(NO_3)_2$, තනුක HCl, $Al_2(SO_4)_3$, $AgNO_3$, සාන්ද්‍ර NH_4OH හා තනුක NH_4OH හි ජලීය ද්‍රාවණ **A, B, C, D, E, F, G** හා **H** ලෙස ලේබල් කර ඇති බෝතල් අටක් (පිළිවෙළට නොවේ) ශිෂ්‍යයෙකුට දෙන ලදී. ඒවා හඳුනාගැනීම සඳහා වරකට ද්‍රාවණ දෙක බැගින් මිශ්‍ර කිරීමෙන් ලැබුණු සමහර ප්‍රයෝජනවත් නිරීක්ෂණ පහත දක්වා ඇත.

	මිශ්‍ර කළ ද්‍රාවණ	නිරීක්ෂණය
I.	**A** + **C**	උණු ජලයෙහි ද්‍රව්‍ය කහ පැහැති අවක්ෂේපයක්
II.	**B** + **C**	**H** හි අද්‍රව්‍ය කහ පැහැති අවක්ෂේපයක්
III.	**A** + **E**	උණු ජලයෙහි ද්‍රව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක්
IV.	**B** + **E**	**D** හි ද්‍රව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක්
V.	**E** + **F**	**G** හි අද්‍රව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක්
VI.	**A** + **F**	**G** හි අද්‍රව්‍ය සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක්
VII.	**D** + **G**	අවර්ණ ද්‍රාවණයක්
VIII.	**H** + **G**	අවර්ණ ද්‍රාවණයක්

(i) **A** සිට **H** හඳුනාගන්න.

A $Pb(NO_3)_2$ ..... **E** $BaCl_2$ .....

B $AgNO_3$ ..... **F** $Al_2(SO_4)_3$ .....

C NaI ..... **G** තනුක HCl .....

D තනුක NH_4OH ..... **H** සාන්ද්‍ර NH_4OH .....

(ලකුණු 04 x 8 = ලකුණු 32)

(ii) I සිට VI එක් එක් ප්‍රතික්‍රියාවෙහි අවක්ෂේප සෑදීම සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න. අවක්ෂේපයක් දැක්වීමට ↓ සලකුණ භාවිත කරන්න.

I. $Pb(NO_3)_2 + 2NaI \rightarrow PbI_2\downarrow + 2NaNO_3$ .....

II. $AgNO_3 + NaI \rightarrow AgI\downarrow + NaNO_3$ .....

III. $Pb(NO_3)_2 + BaCl_2 \rightarrow PbI_2\downarrow + Ba(NO_3)_2$ .....

IV. $2AgNO_3 + BaCl_2 \rightarrow 2\,AgCl\downarrow + Ba(NO_3)_2$ .....

V. $3BaCl_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 3BaSO_4\downarrow + 2AlCl_3$ .....

VI. $3Pb(NO_3)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 3PbSO_4\downarrow + 2Al(NO_3)_3$ .....

(ලකුණු 03 x 6 = ලකුණු 18)

සටහන : අවක්ෂේප දැක්වීම සඳහා ↓ යොදා නොමැති නම් ලකුණු 01 ක් අඩු කරන්න.

2(b): ලකුණු 50

3. (a) උෂ්ණත්වය 25 °C දී $H_2CO_3(aq)$ අම්ලයේ විඝටන නියත
$K_1 = 4.5 \times 10^{-7}$ mol dm^{-3} සහ $K_2 = 4.7 \times 10^{-11}$ mol dm^{-3} වේ.

(i) $H_2CO_3(aq)$ වල පළමු සහ දෙවන විඝටන සඳහා සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.

සටහන: භෞතික අවස්ථා අවශ්‍ය වේ.
සියළු ප්‍රතික්‍රියා සඳහා සමතුලිතතාවයේ සංකේතය ⇌ අවශ්‍ය වේ.

1වන විඝටනය: $H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HCO_3^-(aq)$ ..... **(05)**
හෝ $H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$

2 වන විඝටනය: $HCO_3^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$ ... **(05)**
හෝ $HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

(ii) පළමු විඝටනය සලකමින් 25 °C දී 0.05 mol dm^{-3} $H_2CO_3(aq)$ ද්‍රාවණයක $H_3O^+(aq)$ සහ $HCO_3^-(aq)$ සාන්ද්‍රණ ගණනය කරන්න.

$$K_1 = \frac{[H_3O^+(aq)][HCO_3^-(aq)]}{[H_2CO_3(aq)]}$$ **(05)**

$$H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

ආරම්භක සාන්ද්‍රණය	0.05	0	0	mol dm^{-3}
සාන්ද්‍රණ වෙනස	$-x$	x	x	mol dm^{-3}
සමතුලිත සාන්ද්‍රණය	$0.05 - x$	x	x	mol dm^{-3} **(05)**

$$K_1 = 4.50 \times 10^{-7} = \frac{x.x}{0.05 - x} \approx \frac{x^2}{0.05}$$ **(05)**

$x^2 = 225 \times 10^{-10}$

$x = 1.5 \times 10^{-4}$ mol dm^{-3} **(04 + 01)**

$[H_3O^+(aq)] = [HCO_3^-(aq)] = 1.5 \times 10^{-4}$ mol dm^{-3} **(04 + 01)**

(iii) දෙවැනි විඝටනය සලකමින්, ද්‍රාවණයේ $[CO_3^{2-}(aq)]$ ආසන්න වශයෙන් K_2 වලට සමාන බව පෙන්වන්න. ගන්නා ලද උපකල්පන/ය සඳහන් කරන්න.

$$K_2 = \frac{[H_3O^+(aq)][CO_3^{2-}(aq)]}{[HCO_3^-(aq)]}$$ **(05)**

$$HCO_3^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

ආරම්භක සාන්ද්‍රණ	1.5×10^{-4}	1.5×10^{-4}	0	mol dm^{-3}
සාන්ද්‍රණ වෙනස	$-y$	$1.5 \times 10^{-4} + y$	y	mol dm^{-3}
සමතුලිත සාන්ද්‍රණ	$1.5 \times 10^{-4} - y$	$1.5 \times 10^{-4} + y$	y	mol dm^{-3} **(05)***

$$K_2 = 4.70 \times 10^{-11} = \frac{(1.5 \times 10^{-4} + y).y}{(1.5 \times 10^{-4} - y)} \approx y$$ **(05)***

***HCO_3^- වලින් විඝටනය වූ ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා බවත් H_3O^+ හි එකතු වූ ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා බවත්, එබැවින් විශේෂ දෙකෙහි සාන්ද්‍රණ වෙනස නොසැලකිය හැකි බවත් ශිෂ්‍යයා වචන වලින් ලියන්නේ නම්, මෙම ලකුණු 05 + 05 ලබා දෙන්න.**

$[CO_3^{2-}(aq)] \approx K_2$ **(05**

උපකල්පනය : 1 වන විඝටනයට සාපේක්ෂව 2 වන විඝටනය ඉතා කුඩා බව **(05**

3(a): ලකුණු 60

(*b*) උෂ්ණත්වය 25 °C දී 0.01 mol dm^{-3} $Al^{3+}(aq)$ අයන සහ 0.01 mol dm^{-3} $Ag^{+}(aq)$ අයන අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණයක් ඔබට සපයා ඇත. එම ද්‍රාවණයේ 1.0 dm^3 කට, සාන්ද්‍ර $PO_4^{3-}(aq)$ අයන ද්‍රාවණයක් තොනතවත්වා කලතමින්, බිංදුව බැගින් එකතු කරන ලදී.

උෂ්ණත්වය 25 °C දී,

$K_{sp}(AlPO_4) = 1.3 \times 10^{-20}$ mol^2 dm^{-6} සහ $K_{sp}(Ag_3PO_4) = 8.1 \times 10^{-12}$ mol^4 dm^{-12} වේ.

(i) $PO_4^{3-}(aq)$ ද්‍රාවණය එක් කිරීමේදී සිදු විය හැකි පරිමා වෙනස නොසලකමින්, මිශ්‍රණයෙන් පළමුව අවක්ෂේප වන ලෝහ අයනය (Al^{3+} හෝ Ag^{+}) තුමක්දැයි සඳහන් කරන්න. සුදුසු ගණනය කිරීමක් පදනම් කරගනිමින් ඔබගේ පිළිතුර සඳහා හේතු දක්වන්න.

සෑදෙන අවක්ෂේප $AlPO_4$ සහ Ag_3PO_4

AlPO$_4$ **සඳහා**

$$AlPO_4(s) \rightleftharpoons Al^{3+}(aq) + PO_4^{3-}(aq) \quad \textbf{(02)}$$

$$K_{sp} = [Al^{3+}(aq)][PO_4^{3-}(aq)] \quad \textbf{(02)}$$

$$1.30 \times 10^{-20} = 0.01 \times [PO_4^{3-}(aq)] \quad \textbf{(04)}$$

$AlPO_4(s)$ අවක්ෂේප වීම සඳහා අවශ්‍ය ; $[PO_4^{3-}(aq)] = 1.30 \times 10^{-18}$ mol dm^{-3} **(03+01)**

Ag$_3$PO$_4$ සඳහා

$$Ag_3PO_4(s) \rightleftharpoons 3Ag^{+}(aq) + PO_4^{3-}(aq) \quad \textbf{(02)}$$

$$K_{sp} = [Ag^{+}(aq)]^3[PO_4^{3-}(aq)] \quad \textbf{(02)}$$

$$8.10 \times 10^{-12} = (0.01)^3 \times [PO_4^{3-}(aq)] \quad \textbf{(04)}$$

$Ag_3PO_4(s)$ අවක්ෂේප වීම සඳහා අවශ්‍ය ; $[PO_4^{3-}(aq)] = 8.10 \times 10^{-6}$ mol dm^{-3} **(03+01)**

$$[PO_4^{3-}(aq)]_{AlPO_4(s)} < [PO_4^{3-}(aq)]_{Ag_3PO_4(s)} \quad \textbf{(04)}$$

$AlPO_4(s)$ පළමුව අවක්ෂේප වේ. **(04)**

(ii) දෙවෙනි අයනය අවක්ෂේප වීම ආරම්භ වන විට පළමුව අවක්ෂේප වූ අයනයේ සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.

$AlPO_4(s)$ අවක්ෂේප වූ පසු ද්‍රවණය තුළ ඉතිරිව ඇති $[Al^{3+}aq)] = \frac{K_{sp(AlPO_4(s))}}{8.10 \times 10^{-6}}$ **(04)**

ද්‍රවණය තුළ ඉතිරිව ඇති $[Al^{3+}(aq)] = \frac{1.30 \times 10^{-20}}{8.10 \times 10^{-6}}$

$= 1.6 \times 10^{-15}$ mol dm^{-3} **(03+01)**

3(b): ලකුණු 40

4. *(a)* ● අණුක සූත්‍රය $C_5H_{10}O_3$ ක් වූ **A** කාබනික සංයෝගය වැඩිපුර PCl_5 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 155 ක් වූ **B** සංයෝගය සාදයි. **A** සංයෝගය ජලීය Na_2CO_3 සමග CO_2 මුක්ත කරයි.
(C = 12.0, H = 1.0, O = 16.0, Cl = 35.5)

(i) **A** සංයෝගයේ පවතින ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ලියන්න.

OH / හයිඩ්‍රොක්සි / හයිඩ්‍රොක්සිල් , COOH / කාබොක්සිලික් අම්ලය

.....

සටහන : "අම්ලය" ලෙස ලියා නොමැති නම් ලකුණු ප්‍රදානය නොකරන්න.

(ලකුණු 05 x 2 = ලකුණු 10

● **A** සංයෝගය ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය නොපෙන්වයි. **A** සංයෝගය පිරිවීනියම් ක්ලොරෝක්‍රෝමේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර **C** සංයෝගය සාදයි. **C** සංයෝගය ඇමෝනීය $AgNO_3$ සමග රිදී කැටපතක් ලබාදෙයි. **B** සංයෝගය ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර **D** සංයෝගය සාදයි. **D** සංයෝගය මධ්‍යසාරීය KOH සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ද්විත්ව බන්ධනයක් සහිත **E** ඵලය ලබාදෙයි.

(ii) **A, B, C, D** සහ **E** හි ව්‍යුහ අදාළ කොටු තුළ අඳින්න.

$HOCH_2CH_2CH_2CH_2COOH$	$ClCH_2CH_2CH_2CH_2COCl$
A	**B**
$OHCCH_2CH_2CH_2COOH$	$ClCH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
C	**D**

$H_2C{=}CHCH_2CH_2COOH$

හෝ

$H_2C{=}CHCH_2CH_2COOK$

E

(ලකුණු 07 x 5 = ලකුණු 35)

- **F** සංයෝගය **A** හි ව්‍යුහ සමාවයවිකයක් වේ. **F** සංයෝගය වැඩිපුර PCl_5 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 155 ක් වූ **G** සංයෝගය ලබාදෙයි. **F** සංයෝගය ජලීය Na_2CO_3 සමග CO_2 මුක්ත නොකරයි. **F** සංයෝගය ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. **F** සංයෝගය සාන්ද්‍ර HCl/නිර්ජලීය $ZnCl_2$ සමග පිරියම් කළ විට ආවිල්‍යතාවක් ලබා නොදෙයි. 2,4-ඩයිනයිට්‍රෝෆීනයිල්හයිඩ්‍රසීන් (2,4-DNP) සමග **F** සංයෝගය වර්ණවත් අවක්ෂේපයක් ලබාදෙන අතර ඇමෝනීය $AgNO_3$ සමග රිදී කැටපතක් ලබාදෙයි.

(iii) **F** සංයෝගයේ පවතින ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ලියන්න.


CHO / ඇල්ඩිහයිඩ , OH / හයිඩ්‍රොක්සි / හයිඩ්‍රොක්සිල්

.....


සටහන : පිළිතුරු 2ම නිවැරදි නම් ලකුණු 09 ප්‍රදානය කරන්න, එක් පිළිතුරක් පමණක් නිවැරදි නම් ලකුණු 5ක් පමණක් ප්‍රදානය කරන්න

(ලකුණු 05 + ලකුණු 04 = ලකුණු 09)

(iv) **F** සහ **G** හි ව්‍යුහ අදාළ කොටු තුළ අඳින්න.



(F)




(G)

(ලකුණු 07 x 2 = ලකුණු 14)


4(a): ලකුණු 68

(*b*) (i) ඇසිටෝන් තනුක ජලීය NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සෑදෙන **H** ඵලයේ ව්‍යුහය අදාළ කොටුව තුළ අඳින්න.

(ii) **H** හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය සමග රත් කළ විට සෑදෙන **I** ඵලයේ ව්‍යුහය අදාළ කොටුව තුළ අඳින්න.



H




I

(ලකුණු 06 x 2 = ලකුණු 12)

4(b): ලකුණු 12


(c) (i) ඇසිටෝන් සහ HCN අතර සිදු වන ප්‍රතික්‍රියාවේදී සෑදෙන **J** එලයේ ව්‍යුහය අදාළ කොටුව තුළ අඳින්න



J

(ලකුණු 06)

(ii) ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවෙහි යන්ත්‍රණය ලියන්න.



සටහන : ^-CNවෙනුවට HCN භාවිත කර ඇත්නම් : ^-CNසඳහා වෙන් කර ඇති ලකුණු 02 අඩු කරන්න.

(ලකුණු 14)

4(c): ලකුණු 20

B කොටස — රචනා

ප්‍රශ්න **දෙකකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට **ලකුණු 150** බැගින් ලැබේ.)

සටහන: භෞතික අවස්ථා අවශ්‍ය වේ.

5. (*a*) මවුල අනුපාතය පිළිවෙළින් 2:1 වන NO(g) සහ $O_2(g)$ මිශ්‍රණයක්, පරිමාව 10 dm^3 වන දෘඩ-සංවෘත භාජනයකට ඇතුළත් කර T උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට ඉඩහරින ලදී. යම් කාලයකට පසු පද්ධතිය පහත දක්වා ඇති සමතුලිතතාවයට T උෂ්ණත්වයේදී එළඹුණි.

$$2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

සමතුලිතතාවයේදී පහත දැක්වෙන නිරීක්ෂණ සටහන් කරගන්නා ලදී.

- වායු මිශ්‍රණයේ පීඩනය $32 \times 8.314 \times 10^3$ Pa විය.
- වායු තුනෙහි මුළු මවුල ගණන 0.64 විය.
- O_2 වල ස්කන්ධය 6.4 g විය.

(i) සමතුලිතතාවයේදී එක් එක් වායුමය ප්‍රභේදයෙහි සාන්ද්‍රණය mol dm^{-3} වලින් ගණනය කරන්න. (O = 16)

$$2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons NO_2(g)$$

$O_2(g)$ මවුල ප්‍රමාණය $= \frac{6.4\ g}{32\ g\ mol^{-1}} = 0.20$ **(02)**

$O_2(g)$ සාන්ද්‍රණය $= \frac{0.20\ mol}{10\ dm^3} = 2.0 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$ **(02+01)**

$NO(g)$ මවුල ප්‍රමාණය = 0.40 (2:1 අනුපාතය දී ඇත) **(02)**

$NO(g)$ සාන්ද්‍රණය $= \frac{0.40\ mol}{10\ dm^3} = 4.0 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$ **(02+01)**

$NO_2(g)$ මවුල ප්‍රමාණය $= 0.64 - (0.40 + 0.20) = 0.04$ **(02)**

$NO_2(g)$ සාන්ද්‍රණය $= \frac{0.04\ mol}{10\ dm^3} = 4.0 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$ **(02+01)**

(ii) මෙම T උෂ්ණත්වයේදී සමතුලිතතා නියතය, K_c ගණනය කරන්න.

$$K_C = \frac{[NO_2(g)]^2}{[O_2(g)][NO(g)]^2}$$ **(05)**

$$K_C = \frac{[4.0 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}]^2}{[2.0 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}][4.0 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}]^2}$$ **(05)**

$$\mathbf{K_C = 0.50\ mol^{-1}\ dm^3}$$ **(05)**

(iii) මෙම තත්ත්ව යටතේදී උෂ්ණත්වය T වල අගය (K වලින්) ගණනය කරන්න. ගන්නා ලද උපකල්පන/ය සඳහන් කරන්න.

පරිපූර්ණ වායු ලෙස උපකල්පනය කරමින් **(03)**

$PV = nRT$ **(02)**

$T = \frac{PV}{nR}$

$T = \frac{32 \times 8.314 \times 10^3 Pa \times 10 \times 10^{-3} m^3}{0.64\ mol \times 8.314\ Jk^{-1}\ mol^{-1}}$ **(05)**

$T = 500\ K$ **(04+01)**

(iv) $2NO_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + O_2(g)$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ඉහත (iii) හි නිර්ණය කරන ලද උෂ්ණත්වයේදී සමතුලිතතා නියතය, K_p ගණනය කරන්න.

$2NO_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + O_2(g)$ යනු ආරම්භක ප්‍රතික්‍රියාවේ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව වේ. **(05)**

සමතුලිතතා නියතය K_C' නම්,

$K_C' = \frac{1}{K_C}$ **(05)**

$= \frac{1}{0.50} = 2\ mol\ dm^{-3}$ **(04+01)**

$K_P = K_C\ (RT)^{\Delta n} \qquad \Delta n = 1$ **(03+02)**

$K_P = 2\ (8.314\ Jk^{-1}\ mol^{-1} \times 500K)$

$\boldsymbol{K_P = 8.314 \times 10^3\ Pa}$ **(04+01)**

5(a): ලකුණු 70

(b) උෂ්ණත්වය 298 K හි පහත දී ඇති තොරතුරු සලකන්න.

$\Delta H_f^{\circ}(NO(g)) = 90\ kJ\ mol^{-1}$

$\frac{1}{2}N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g)\ \Delta H^{\circ} = 33\ kJ\ mol^{-1}$

$4NO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2N_2O_5(g)\ \Delta H^{\circ} = -102\ kJ\ mol^{-1}$

දී ඇති තොරතුරු අනුව

$\Delta H_{f\ (NO(g))}^{\theta} = 90\ kJ\ mol^{-1}$.....(A)

$\frac{1}{2}N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g)$: $\Delta H^{\theta} = 33\ kJ\ mol^{-1}$ .....(B)

$4NO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2N_2O_5(g)$: $\Delta H^{\theta} = -102\ kJ\ mol^{-1}$.....(C)

(i) උෂ්ණත්වය 298 K හිදී,

$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ΔH° ගණනය කරන්න.

අවශ්‍ය ප්‍රතික්‍රියාව : $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$

Aවලින් , $\Delta H_{f\,(NO(g))}^{\theta}$: $\frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO(g)$: $\Delta H^\theta = 90\ kJ\ mol^{-1}$ .. **(D)** **(05)**

(B) – (D) : $\frac{1}{2}O_2(g) + NO(g) \rightarrow NO_2(g)$ ..... **(E)** **(05)**

$\Delta H^\theta = (33 - 90) = -57\ kJ\ mol^{-1}$ **(05 +05)**

(E) × 2 : $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ $\boldsymbol{\Delta H^\theta = -114\ kJ\ mol^{-1}}$ **(04+01)**

හෝ : (B) × 2 – (D) × 2 : $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ **(05+05)**

$\Delta H^\theta = (66 - 180)\ kJ\ mol^{-1}$ **(05+05)**

$\Delta H^\theta = -114\ kJ\ mol^{-1}$ **(04+01)**

හෝ :

$2NO(g) + O_2(g) \xrightarrow{\Delta H^\theta} 2NO_2(g)$ **(05)**

(05) ΔH_1^θ ΔH_2^θ **(05)**

$N_2(g) + 2O_2(g)$

හේස් නියමයට අනුව $\Delta H^\theta = \Delta H_2^\theta - \Delta H_1^\theta = (2 \times 33 - 2 \times 90)\ kJ\ mol^{-1}$ **(05)**

$= -114\ kJ\ mol^{-1}$ **(04+01)**

හෝ වෙනත් පිළිගත හැකි ක්‍රමයක්

(ii) උෂ්ණත්වය 298 K හිදී $\Delta H_f^\circ(N_2O_5(g))$ ගණනය කරන්න.

$2N_2O_5(g)$ හි උත්පාදනයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව :

$N_2(g) + \frac{5}{2}O_2(g) \rightarrow N_2O_5(g)$: $\Delta H_f^\theta = ?$ **(05)**

තොරතුරු: $\frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow NO(g)$: $\Delta H^\theta = 90\ kJ\ mol^{-1}$..... **(D)**

(D) × 2 : $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$: $\Delta H^\theta = 180\ kJ\ mol^{-1}$..... **(F)** **(05+05)**

$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g)$ $\Delta H^\theta = -114\ kJ\ mol^{-1}$ .... **(G)**

$4NO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2N_2O_5(g)$: $\Delta H^\theta = -102\ kJ\ mol^{-1}$ **(C)**

(C) ÷ 2 : $2NO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow N_2O_5(g)$: $\Delta H^\theta = -51\ kJ\ mol^{-1}$ ..... **(H)** **(05)**

(F) + (G) + (H): $N_2(g) + \frac{5}{2}O_2(g) \rightarrow N_2O_5(g)$

$\Delta H_{f\,(N_2O_5(g))}^{\theta} = [180 + (-114) + (-51)]\ kJ\ mol^{-1} = \mathbf{15\ kJ\ mol^{-1}}$ **(05+04+01)**

හෝ :

$$4NO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{-102} 2N_2O_2(g)$$ **(05)**

(05) **4 x 33** $2\Delta H^{\theta}_{f(N_2O_5(g))}$ **(05)**

$$2\,N_2(g) + 5O_2(g)$$

හේස් නියමයට අනුව $2\Delta H^{\theta}_{f(N_2O_5(g))} = (4 \times 33 - 102)\ kJ\ mol^{-1}$ **(05+05)**

$\Delta H^{\theta}_{f(N_2O_5(g))} = \mathbf{15}\ kJ\ mol^{-1}$ **(04+01)**

හෝ වෙනත් පිළිගත හැකි ක්‍රමයක්

(iii) ඉහත (ii)හි දී ලැබුණු ප්‍රතිඵල ආධාරයෙන් පහත දැ පුරෝකතනය කරන්න.

I. $\Delta S^{\circ}_{f}(N_2O_5(g))$ හි සලකුණ

II. $N_2(g)$ සහ $O_2(g)$ වලින් $N_2O_5(g)$ සෑදීමේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසිද්ධතාවය

I. $N_2(g) + \frac{5}{2}O_2(g) \rightarrow N_2O_5(g)$

අඩු වූ මවුල ප්‍රමාණය : මවුල 3.5 → මවුල1 **(05)**

$\Delta H^{\theta}_{S}(N_2O_5(g))$ සෘණ (< 0) වේ **(05)**

II. $\Delta G^{\theta} = \Delta H^{\theta} - T\Delta S^{\theta}$ **(05)**

$= +ve - (+ve)(-ve) = +ve$ **(05)**

උෂ්ණත්වය 298 K දී ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ නොවේ. **(05)**

5(b): ලකුණු 80

6. (*a*) වායු සඳහා වූ චාලක අණුක වාදය අනුව පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා T උෂ්ණත්වයේදී $PV = \frac{1}{3}mN\overline{C^2}$ වේ. මෙහි P වායුවේ පීඩනය ද, V වායුවේ පරිමාව ද, m වායු අණුවක ස්කන්ධය ද, N වායු අණු ගණන ද, $\overline{C^2}$ වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය ද වේ.

(i) පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා $\overline{C^2} = \frac{3RT}{M}$ බව පෙන්වන්න. M යනු වායුවේ මවුලික ස්කන්ධය වේ.

සටහන : භෞතික තත්ත්ව අවශ්‍ය වේ.

$PV = \frac{1}{3}mN\overline{C^2} = \frac{1}{3}m(nN_A)\overline{C^2}$: n – මවුල, N_A ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය **(04)**

$= \frac{1}{3}nM\overline{C^2}$: M-මවුලික ස්කන්ධය **(04)**

$PV = nRT = \frac{1}{3}nM\overline{C^2}$ **(04)**

$\overline{C^2} = \frac{3RT}{M}$ **(04)**

(ii) **A** සහ **B** යනු මවුලික ස්කන්ධයන් පිළිවෙළින් M_A සහ M_B වූ පරිපූර්ණ වායු දෙකකි.

උෂ්ණත්වය $T = 300\frac{M_B}{M_A}$ හිදී, **B** වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය $\left(\overline{C_B^2}\right)$, උෂ්ණත්වය $T = 300$ හිදී **A** වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය $\left(\overline{C_A^2}\right)$ ට සමාන බව පෙන්වන්න. (උෂ්ණත්ව කෙල්වින්වලින් දී ඇත.)

A වායුව සඳහා: $\overline{C_A^2} = \frac{3RT}{M_A} = \frac{3R \times 300}{M_A}$ ... ... (1)

B වායුව සඳහා: $\overline{C_B^2} = \frac{3RT}{M_B} = \frac{3R \times 300(\frac{M_B}{M_A})}{M_B} = \frac{3R \times 300}{M_A}$ ... ... (2) **(04+04)**

(1) = (2): $\overline{C_A^2} = \overline{C_B^2}$ **(04)**

(iii) දී ඇති ඕනෑම T උෂ්ණත්වයකදී **A** සහ **B** වායු දෙකෙහි මවුලික චාලක ශක්තීන් අතර අනුපාතය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

උෂ්ණත්වය T වලදී මවුලයක් සඳහා චාලක ශක්තිය $(KE) = \frac{3RT}{2}$

A වායුව සඳහා: $(KE)_A = \frac{3RT_A}{2}$ **(04)**

B වායුව සඳහා: $(KE)_B = \frac{3RT_B}{2}$ **(04)**

As $T_A = T_B$: $(KE)_A = (KE)_B$ **(04)**

හෝ වායුවක චාලක ශක්තිය (නිරපේක්ෂ) උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී.

$(KE)_A = (KE)_B$ **(12)**

6(a): ලකුණු 40

(*b*) (i) 'ප්‍රාථමික ප්‍රතික්‍රියාවක්' යන පදය අර්ථ දක්වන්න.

මූලික ප්‍රතික්‍රියාව : තනි පියවරකින් පමණක් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව (අතරමැදියක් සහභාගි නොවන) **(05)***

(ii) ප්‍රතික්‍රියාවක 'අණුකතාවය' යන පදය අර්ථ දක්වන්න.

අණුකතාවය : මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා හෝ ප්‍රතික්‍රියාවක වේග නිර්ණ පියවර සඳහා සහභාගිවන මුළු ප්‍රතික්‍රියක අණු සංඛ්‍යාව **(05)**

(iii) ප්‍රාථමික ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා 'ප්‍රතික්‍රියා පෙළ' සහ 'අණුකතාවය' අතර සම්බන්ධතාවය කුමක් ද?

මූලික ප්‍රතික්‍රියාව : ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ = අණුකතාව **(05)***

(iv) ප්‍රතික්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියකයේ සාන්ද්‍රණය කාලය සමඟ වෙනස්වන අයුරු පහත සඳහන් වගුවේ දක්වා ඇත.

කාලය (මිනිත්තු)	0	10	20	30	40
ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණය ($mol\ dm^{-3}$)	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1

I. ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ නිර්ණය කරන්න.

II. ප්‍රතික්‍රියාවේ අර්ධ-ජීව කාලය සඳහන් කරන්න.

මිනිත්තු 10 දී සාන්ද්‍රණය ආරම්භක සාන්ද්‍රණයෙන් අඩක් වේ. **(05)**
මෙය මිනිත්තු 10 යේ කාල පරාසවලින් සමන්විත වේ. **(05)**

I) ප්‍රතික්‍රියාව පළමු පෙළ වේ. **(05)**

II) ප්‍රතික්‍රියාවේ අර්ධ ආයු කාලය මිනිත්තු 10 ක් වේ. **(05)**

*** ශිෂ්‍යයකු ප්‍රශ්න අංක 6(b) සඳහා උත්සාහ කර ඇත්නම්, (i) සහ (iii) කොටස් සඳහා ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.**

(v) දෙන ලද උෂ්ණත්වයකදී, ① සහ ② පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවන් දෙකක් සඳහා පහත දී ඇති හොරතුරු සලකන්න.

ප්‍රතික්‍රියාව	ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව/ $mol\ dm^{-3}\ s^{-1}$	ශීඝ්‍රතා නියතය/s^{-1}	අර්ධ-ජීව කාලය/s
①: $A \longrightarrow P_1$	r_A	k_A	$(t_{1/2})_A$
②: $B \longrightarrow P_2$	r_B	k_B	$(t_{1/2})_B$

(P_1, P_2 = එල)

වේග නියතය k වූ පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා අර්ධ-ජීව කාලය, $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$ වේ.

$[B] = 2[A]$ වූ විට $r_B = 3r_A$ නම්, $2(t_{1/2})_A = 3(t_{1/2})_B$ බව පෙන්වන්න.

මේවා පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියා නිසා,

$r_A = k_A[A]$: $\quad k_A = \frac{r_A}{[A]}$ **(03+0**

$r_B = k_B[B]$: $\quad k_B = \frac{r_A}{[B]}$ **(03+0**

$[B] = 2[A]$, $r_B = 3r_A$ *and* $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$ දී ඇත

$$k_A = \frac{r_A}{[A]} \quad \text{.....(I)}$$

$$k_B = \frac{3r_A}{2[A]} \quad \text{.....(II)} \quad \text{ලෙස ලිවිය හැක} \qquad \textbf{(05)}$$

(I)÷(II) $\quad \frac{k_A}{k_B} = \frac{2}{3}$ ලබා දේ **(05+05)**

$$\frac{(t_{1/2})_A}{(t_{1/2})_B} = \frac{0.693/k_A}{0.693/k_B} = \frac{k_B}{k_A} = \frac{3}{2} \qquad \textbf{(05+05)}$$

$$\mathbf{2(t_{1/2})_A = 3(t_{1/2})_B} \qquad \textbf{(05)}$$

6(b): ලකුණු 75

(c) උෂ්ණත්වය 25 °C දී 0.30 g dm^{-3} ජලීය අයඩීන් ද්‍රාවණයකින් 50.0 cm^3, CCl_4 10.0 cm^3 සමඟ හොඳින් සොලවන ලදී. පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට එළඹි විට ජල ස්ථරයේ අයඩීන් සාන්ද්‍රණය 0.02 g dm^{-3} බව සොයාගන්නා ලදී.

(i) සමතුලිතතාවයේදී CCl_4 ස්ථරයේ අයඩීන් සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.

ජලීය ස්ථරයේ ආරම්භක I_2 ස්කන්ධය = 0.30 g dm^{-3} × 50 × 10^{-3} dm^3 = 0.015 g **(03)**

ජලීය ස්ථරයේ සමතුලිත I_2 ස්කන්ධය = 0.02 g dm^{-3} × 50 × 10^{-3} dm^3 = 0.001 g **(03)**

සමතුලිත අවස්ථාවේ $[I_2]_{H_2O} = \frac{(0.001\ g)}{50 \times 10^{-3} dm^3} = 0.02\ \text{g}\ dm^{-3}$

CCl_4 ස්ථරයේ සමතුලිත I_2 ස්කන්ධය $= (0.015 - 0.001)g = 0.014\ g$ **(03)**

සමතුලිත අවස්ථාවේ $[I_2]_{CCl_4} = \frac{(0.014\ g)}{10 \times 10^{-3} dm^3} = \mathbf{1.4\ g\ dm^{-3}}$ **(03+03+01)**

(ii) උෂ්ණත්වය 25 °C දී, CCl_4 සහ ජලය අතර I_2 වල විභාග සංගුණකය ගණනය කරන්න.

$$K_D = \frac{[I_2]_{CCl_4}}{[I_2]_{H_2O}} = \frac{1.4\ \text{g}\ dm^{-3}}{0.02\ \text{g}\ dm^{-3}} = \mathbf{70} \qquad \textbf{(03+03)}$$

(iii) ඉහත පරීක්ෂණය 25 °C දී, CCl_4 10.0 cm^3 වෙනුවට 20.0 cm^3 යොදා කළේ නම් සමතුලිතතාවයේදී ජල ස්ථරයේ අයඩීන් සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.

මෙම අවස්ථාවේදී ජලීය ස්ථරයෙහි අඩංගු I_2 ස්කන්ධය x ලෙස සලකමින්

$$K_D = 70 = \frac{[I_2]_{CCl_4}}{[I_2]_{H_2O}} = \frac{(0.015-x)/20}{x/50} \qquad \textbf{(05)}$$

$$x = 0.0005g \qquad \textbf{(04)}$$

$$[I_2]_{H_2O} = \frac{(0.0005\ g)}{50 \times 10^{-3} dm^3} = \mathbf{0.01\ g\ dm^{-3}} \qquad \textbf{(03+01)}$$

6(c): ලකුණු 35

විකල්ප පිළිතුරු:

මෙම අවස්ථාවේදී CCl_4 ස්ථරයෙහි අඩංගු I_2 ස්කන්ධය x ලෙස සලකමින්

$$K_D = 70 = \frac{[I_2]_{CCl_4}}{[I_2]_{H_2O}} = \frac{x/20}{(0.015-x)/50} \qquad \textbf{(05)}$$

$$x = 0.0145\ g \qquad \textbf{(02)}$$


ජලීය ස්ථරයේ I_2 ස්කන්ධය = 0.0150 – 0.0145 = 0.0005 g **(02)**

$$[I_2]_{H_2O} = \frac{(0.0005\ g)}{50 \times 10^{-3} dm^3} = \mathbf{0.01\ g\ dm^{-3}} \qquad \textbf{(03+01)}$$

7.(a) නිෂ්ක්‍රිය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ (උදාහරණ :Pt, ග්‍රැෆයිට්) භාවිත කර විලීන $MgCl_2(l)$ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයෙන් Mg ලෝහය නිස්සාරණය කළ හැක. මේ සඳහා වූ සරල ඇටවුමක් රූපයේ දක්වා ඇත.

$$E^{\circ}_{Mg^{2+}(l)/Mg(s)} = -2.37\ V$$

$$E^{\circ}_{H_2O(l)/H_2(g)} = -0.63\ V$$



විද්‍යුත් විච්ඡේදන කෝෂය

(i) ඇනෝඩය හා කැතෝඩය හඳුනාගන්න. එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙහි සිදුවන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

සටහන : භෞතික අවස්ථා අනිවාර්ය වේ.

ඉලෙක්ට්‍රෝඩය	අර්ධ - ප්‍රතික්‍රියාව	
ඇනෝඩය : C(ග්‍රැෆයිට්, s)|Cl_2(g)|$MgCl_2(l)$	$2Cl^-(l) \rightarrow Cl_2(g) + 2e$	**(05+05)**
කැතෝඩය: Pt(s)|Mg(s)|$MgCl_2(l)$	$Mg^{2+}(l) + 2e \rightarrow Mg(s)$ හෝ $Mg(l)$	**(05+05)**
හෝ	$MgCl_2(l) \rightarrow Mg(s)/(l) + Cl_2(g)$	**(05)**

(ii) සම්පූර්ණ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

සම්පූර්ණ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව:

$$Mg^{2+}(l) + 2Cl^-(l) \rightarrow Mg(s)/(l) + Cl_2(g)$$

හෝ $MgCl_2(l) \rightarrow Mg(s)/(l) + Cl_2(g)$ **(05)**

(iii) කෝෂය ක්‍රියා කිරීමේදී බාහිර පරිපථය තුළින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාව ගලන දිශාව සඳහන් කරන්න.

C(ග්‍රැෆයිට්, s)|Cl_2(g)ඇනෝඩයේ සිට Pt(s)|Mg(s) කැතෝඩය දක්වා **(05)**

(iv) පහත සඳහන් දෑ පහදන්න.

I. මෙම නිස්සාරණ ක්‍රියාවලියේදී $MgCl_2(s)$ වෙනුවට විලීන $MgCl_2(l)$ භාවිත කෙරේ.

II. මෙම නිස්සාරණ ක්‍රියාවලියේදී $MgCl_2(aq)$ ද්‍රාවණයක් භාවිත කළ නොහැක.

I. ඝණ හෝ ස්ඵටික $MgCl_2(s)$ හි සචල අයන නොමැත විලීන අවස්ථාවේ $Mg^{2+}(l)$ සහ $Cl^-(l)$ අයන ඇත. **(05**

II. $Mg^{2+}(l)$ ඔක්සිහරණය වෙනුවට ජලය ඔක්සිහරණයෙන් $H_2(g)$ ලබා දේ **(05**

(v) මෙම කෝෂය තුළින් 5.37 A ධාරාවක් පැයක කාලයක් යවා සෑදෙන $Cl_2(g)$ උෂ්ණත්වය 300 K සහ පීඩනය 1 atm (~ 1.0×10^5 Pa) යටතේ එකතු කරගන්නා ලද්දේ නම්, නිපදවෙන $Cl_2(g)$ හි පරිමාව dm^3 වලින් ගණනය කරන්න. (1 F = 96 500 C)

$Q = It$ **(05)**

$= 5.37\ A \times (60 \times 60) = 19300\ C$ **(04+1)**

ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල = 19300/96500 = 0.2 mol **(05)**

ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 mol ≡ $Cl_2(g)$ 1 mol

සෑදෙන $Cl_2(g)$ මවුල = 0.10 mol **(05)**

පරිපූර්ණ වායුවක් ලෙස උපකල්පනය කිරීමෙන් : PV = nRT **(05)**

$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0.10\ mol \times 8.314\ Jk^{-1}mol^{-1} \times 300\ K}{1 \times 10^5\ Pa}$ **(05)**

$= 249.4 \times 10^{-5}\ m^3$ හෝ $2.49\ dm^3$ **(04+01)**

7(a): ලකුණු 75

(b) (i) **P, Q, R, S** හා **T** යනු Co(III) හි සංඝන සංයෝග වේ. ඒවාට අම්ලකලිල ඇමෝනියා ඇත. පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු විශේෂ තෝරා ගනිමින් මෙම සංඝන සංයෝගයන්හි වනුත සුදු දෙන්න නෝ වනුත පදිනන්න.

Co^{3+}, K^+, NH_3, SO_4^{2-}, NO_2^-, Cl^-

සටහන : ඉහත සංඝන සංයෝගවල NO_2^- ලෝහ අයනයට සම්බන්ධ වන විට ඒක-බන්ධන ලිගනයක් ලෙස ගැසිරේ.

P – උදාසීන ලිගන පමණක් ලෝහ අයනයට සංඝන වී ඇත. **P** හි ජලීය ද්‍රාවණයක් තනුක HCl සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට රතු-දුඹුරු දුමාරයක් පිට වේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී **P**, අයන හතරක් දෙයි.

Q – ලිගන වර්ග දෙකක් ලෝහ අයනයට සංඝන වී ඇත. ඒවා උදාසීන ලිගන හා ඒක-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන වේ. **Q** හි ජලීය ද්‍රාවණයකට $BaCl_2(aq)$ එක් කළ විට, තනුක අම්ලවල අද්‍රාව්‍ය සුදු අවක්ෂේපයක් සෑදේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී **Q**, අයන දෙකක් ලබාදෙයි.

R – ලිගන වර්ග දෙකක් ලෝහ අයනයට සංඝන වී ඇත. ඒවා උදාසීන ලිගන හා බහු-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන වේ. **R** ජාත්‍යාන්තික සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. **R** හි ජලීය ද්‍රාවණයක් $AgNO_3(aq)$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සුදු අවක්ෂේපයක් සෑදේ. එම අවක්ෂේපය තනුක NH_4OH හි ද්‍රාව්‍ය වේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී **R**, අයන දෙකක් ලබාදෙයි.

S – මෙය අයනික නොවන සංයෝගයකි. උදාසීන ලිගන හා බහු-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන සමාන ගණනක් ලෝහ අයනයට සංඝන වී ඇත.

T – ඒක-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන පමණක් ලෝහ අයනයට සංඝන වී ඇත. ජලීය ද්‍රාවණයේදී **T**, අයන හතරක් දෙයි.

(i)

P : $[Co(NH_3)_6](NO_2)_3$ **(10)**

Q: $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ **(10)**

R: $[Co(NH_3)_4(NO_2)_2]Cl$ **(10) ***

S: $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$ **(10)**

T: $K_3[CoCl_6]$ **(10)**


(7 (b) (i) ලකුණු 50)

(ii) I. **T** හි IUPAC නාමය ලියන්න.

potassium hexachloridocobaltate(III)

(10)

II. **R** හි ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකයන්හි ව්‍යුහ අඳින්න.




(05)*

(ව්‍යුහ දෙකම නිවැරදි නම් ලකුණු 05ක්. ව්‍යුහ එකක් පමණක් නිවැරදි නම් ලකුණු 03ක්)

***සටහන :** ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාව සාමාන්‍යයෙන් උසස් පෙළ වලදී උගන්වනු ලැබුවද, බණ්ඩාංක සංකීර්ණ වලදී සිසුන් ඒවා ගැන හුරුපුරුදු නොවිය හැකිය. එබැවින්, සහනයක් ලෙස, **7 b (i) R** සහ **(ii) II** සඳහා පහත පරිදි ලකුණු ප්‍රදානය කෙරේ.

(i) R: $[Co(NH_3)_5(SO_4)]Cl$ **(06)**

(ii) II.



(03)

(iii) **X** යනු අෂ්ටතලීය ජ්‍යාමිතියක් සහිත Co(III) හි සංඝන සංයෝගයක් වේ. H_2O හා CO_3^{2-} ලියන ලෝහ අයනයට සංඝන වී ඇත. **X** හි ජලීය ද්‍රාවණයක් $AgNO_3(aq)$ සමඟ පිරියම් කළ විට සාන්ද්‍ර NH_4OH හි ද්‍රාව්‍ය වූ-කහ අවක්ෂේපයක් සෑදේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී **X**, අයන දෙකක් දෙයි. **X** හි ව්‍යුහ සූත්‍රය දෙන්න හෝ ව්‍යුහය අඳින්න.

සටහන : CO_3^{2-} ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් මගින් ලෝහ අයනයට සංඝන වේ.


$[Co(H_2O)_4(CO_3)]Br$ **(10)**

7(b): ලකුණු 75

C කොටස — රචනා


ප්‍රශ්න **දෙකකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට **ලකුණු 150** බැගින් ලැබේ.)

8. (a) එකම කාබනික ආරම්භක ද්‍රව්‍යය ලෙස එතනොල් භාවිත කරමින් **V** සංයෝගය සෑදීම පිණිස වූ ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමයක් පහත දී ඇත.



P, Q, R, S, T සහ **U** සංයෝගයන්හි ව්‍යුහ ඇඳීමෙන් සහ ප්‍රතික්‍රියා **1 - 6** සඳහා සුදුසු ප්‍රතිකාරක, දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් **පමණක්** තෝරාගෙන ලිවීමෙන්, ඉහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය සම්පූර්ණ කරන්න.

ප්‍රතිකාරක:
තනුක H_2SO_4, Mg/වියළි ඊතර, PBr_3, පිරිඩිනියම් ක්ලෝරොක්‍රෝමේට (PCC)





*Q හි ව්‍යුහය දී නොමැති නම් හෝ වැරදි නම්, නමුත් එය ප්‍රතිකාරයක් ලෙස සුදුසු ස්ථානයකදී **නිවැරදිව** භාවිතා කර ඇත්නම් එක්වරක් පමණක් **ලකුණු 06** ක් ප්‍රදානය කරන්න.

සටහන : Q හි ව්‍යුහය දී නොමැති නම් හෝ වැරදි නම්, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය අනුව පිළිතුරෙහි ඉතිරි කොටස සඳහා ලකුණු ලබා දෙන්න.

8(a): ලකුණු 60

(b) (i) පහත දැක්වෙන පරිවර්තනය **හතරකට (04)** නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවකින් සිදු කරන ආකාරය පෙන්වන්න.






*මෙතනෝල් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අවශ්‍ය වේ. මෙතනෝල් ලියා නොමැති නම් ලකුණු 01 ක් අඩු කරන්න.

** මෙයට දැනට විෂය නිර්දේශයෙහි සහ ගුරු මාර්ගෝපදේශයෙහි සඳහන් නොවන අතර, එය යල් පැන ගිය ක්‍රමයක් නමුත් සමහර පාසල්වල තවමත් මෙය ඉගැන්වීම සිදු කරන බව පෙනී යයි. මෙය සිසුන්ට සාධාරණයක් කිරීම පිණි ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටියේ ඇතුළත් කර ඇත.

(ලකුණු 25)


විකල්ප පිළිතුර :

ගුරු මාර්ගෝපදේශයේ බෙන්සීන් බෙන්සැල්ඩිහයිඩ් බවට පරිවර්තනය කිරීම විෂය නිර්දේශයේ හෝ ගු මාර්ගෝපදේශයේ දී නොමැති අතර, සමහර පාසල්වල තවමත් මෙය ඉගැන්වීමසිදු කරන බව පෙනී යයි. එබැවි සාධාරණයක් සිදුවන පරිදි ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටියෙහි විකල්ප ක්‍රමයක් ලෙස මෙය ඇතුළත් කර ඇත.



(ලකුණු 2

(ii) දෙකකට **(02)** නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවක් භාවිත කරමින් ඇනිලීන්වලින්, සාදාගැනීම සඳහා ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.





(ලකුණු 15)

8(b): ලකුණු 40

(c) (i) නිර්ජලීය $FeBr_3$ හමුවේ දී බෙන්සීන් සහ බ්‍රෝමීන් අතර සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවේ ඵලය සහ යාන්ත්‍රණය ලියන්න.

$Br_2 + FeBr_3 \longrightarrow Br-\overset{+}{Br}-\overset{-}{F}eBr_3$ හෝ $Br^{+}\ \overset{-}{F}eBr_4$ හෝ $Br-\overset{+}{Br}\ \overset{-}{F}eBr_3$ හෝ $\overset{\delta+}{Br}-\overset{\delta-}{Br}\ FeBr_3$ (04)






(ලකුණු 26)

(ii) බෙන්සීන් සහ ඇනිලීන්වල සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ අඳින්න.

බෙන්සීන්හි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ



ඇනලීන්හි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ



සටහන: එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල දක්වා නොමැති නම්, එක් වරක් පමණක් **ලකුණු 02ක්** අඩු කරන්න.

(ලකුණු 02 x 7 = ලකුණු 14)


(iii) ඇනිලීන්හි බෙන්සීන් න්‍යෂ්ටිය ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා කෙරෙහි බෙන්සීන්වලට වඩා ප්‍රතික්‍රියාශීලී වන්නේ මන්දැයි ඉහත සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සලකමින් පැහැදිලි කරන්න.

නයිට්‍රජන්(N) පරමාණුවේ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය ඇනිලීන් හි බෙන්සීන් වලයට විස්ථානගත වීම **(ලකුණු 03)** හේතුවෙන් ඇනිලීන් හි බෙන්සීන් වලය බෙන්සීන් හා සසඳන විට ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් පොහොසත් වේ. **(ලකුණු 03)**

එබැවින්, ඇනිලීන් හි බෙන්සීන් වලය බෙන්සීන් වලට වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිල කෙරෙහි ප්‍රතික්‍රියාශීලී වේ.

(ලකුණු 06

(iv) ඇනිලීන්, බ්‍රෝමීන් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සෑදෙන එලයේ ව්‍යුහය අඳින්න.



(ලකුණු 04


8(c): ලකුණු 50


9. (*a*) පහත දී ඇති ප්‍රශ්නය කැටායනවල ගුණාත්මක විශ්ලේෂණය මත පදනම් වේ.

M නැමැති ජලීය ද්‍රාවණයක **A, B, C** සහ **D** යන එක් එක් ලෝහයෙහි කැටායනයක් බැගින් අඩංගු වේ.

පහත දී ඇති පටිපාටිය අනුව **M** විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ.

කොටුව තුළ දී ඇති සංකේත මගින් අවක්ෂේපය සහිත ද්‍රාවණය, සන ද්‍රව්‍ය, ද්‍රාවණ සහ වායු නිරූපණය වේ.





A_1–A_4, B_1–B_3, C_1–C_4 සහ D_1–D_5 පහු **A, B, C** සහ **D** ලෝහවල කැටායන හතරෙහි සංයෝග/විශ්ලේෂ වේ. **X** වායුවකි.

A_1, A_2, A_3, A_4, B_1, B_2, B_3, C_1, C_2, C_3, C_4, D_1, D_2, D_3, D_4, D_5 සහ **X** හඳුනාගන්න.

(සටහන : රසායනික සූත්‍ර **පමණක්** ලියන්න. රසායනික සමීකරණ සහ හේතු අවශ්‍ය **නැත.**)

9. (a)

A_1:	CuS	**(06)**
A_2:	$Cu(OH)_2$	**(04)**
A_3:	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$	**(04)**
A_4:	$[CuCl_4]^{2-}$	**(04)**
B_1:	$Cr(OH)_3$	**(06)**
B_2:	Na_2CrO_4	**(04)**
B_3:	$Na_2Cr_2O_7$	**(04)**
C_1:	MnS	**(06)**
C_2:	$[Mn(H_2O)_6]^{2+}$	**(04)** සටහන: $Mn^{2+}(aq)$ නම් ලකුණු 02ක් පමණි.
C_3:	$Mn(OH)_2$	**(04)**
C_4:	$[MnCl_4]^{2-}$	**(04)**
D_1:	$CaCO_3$	**(06)**
D_2:	CaO	**(04)**
D_3:	$Ca(OH)_2$	**(04)**
D_4:	$CaSO_4$	**(04)**
D_5:	$Ca(HCO_3)_2$	**(04)**
X:	CO_2	**(03)**

(ලකුණු 06 x 4 + ලකුණු 04 x 12 + ලකුණු 03 x 1)

9(a): ලකුණු 75

(b) අයන් පයිරයිට්වල ඇති ප්‍රධාන සංයෝගය FeS_2 වේ. අයන් පයිරයිට් 1.50 g සාම්පලයක් විද්‍යාගාර තත්ව යටතේ ඔක්සිකරණය කර FeS_2 හි ඇති සල්ෆර් සියල්ල SO_4^{2-} බවට පරිවර්තනය කරන ලදී. මෙහිදී ලැබෙන SO_4^{2-}, $BaSO_4$ ලෙස අවක්ෂේප කරන ලදී. ලැබුණු $BaSO_4$ හි වියළි බර 4.66 g විය.

(i) අයන් පයිරයිට්වල ඇති FeS_2 හි බර ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

අයන් පයිරයිට් 20.0 g හි ඇති FeS_2 පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් ස්වභාවික තත්ව යටතේ පැය 120 ක් ඔක්සිකරණයට භාජනය කරන ලදී.

මෙම ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව පහත සමීකරණයෙන් නිරූපණය කර ඇත.

$$4FeS_2(s) + 15O_2(g) + 14H_2O(l) \xrightarrow{\text{පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන්}} 4Fe(OH)_3(s) + 8H_2SO_4(aq)$$

පැය 120 කට පසුව මෙම ප්‍රතික්‍රියාවෙන් නිපදවෙන H_2SO_4 ප්‍රමාණාත්මකව වෙන් කරගෙන $BaSO_4$ ලෙස අවක්ෂේප කරන ලදී. ලැබුණු $BaSO_4$ හි වියළි බර 31.13 g විය.

$BaSO_4$ හි මවුලික ස්කන්ධය = 137 + 32 + 64 = 233 g mol-1 **(03)**

FeS_2 හි මවුලික ස්කන්ධය = 56 + 64 = 120 g mol-1 **(03)**

$BaSO_4$ හි මවුල $= \frac{4.66}{233} = 0.02$ mol **(03)**

FeS_2 හි මවුල 1 ක් $BaSO_4$ හි මවුල 2 ක් ලබා දෙයි **(03)**

$\therefore FeS_2$ හි මවුල $= \frac{0.02}{2} = 0.01$ mol **(03)**

$\therefore FeS_2$ හි බර $= 0.01 \times 120 = 1.20$ g **(03)**

$\therefore$ යකඩ පයිරයිට් වල FeS_2 හි බර ප්‍රතිශතය $= \frac{1.20}{1.50} \times 100$ **(03)**

$= 80\%$ **(04)**

(9b(i): ලකුණු 25)

(ii) පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් පැය 120 කට පසුව අයන් පයිරයිට්හි ඇති FeS_2, SO_4^{2-} බවට පරිවර්තනය වීමේ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

FeS_2 4 mol $\rightarrow$ H_2SO_4 8 mol $\rightarrow$ $BaSO_4$ 8 mol

යකඩ පයිරයිට් 20.0g ක FeS_2 ප්‍රමාණය $= 20.0 \times \frac{80}{100}$ **(03)**

$= 16.0$ g **(03)**

$BaSO_4$ හි සෛධාන්තික ස්කන්ධය ගණනය කිරීම
සමීකරණයට අනුව

FeS_2 හි මවුල 4 ක් $BaSO_4$ මවුල 8 ක් ලබා දෙයි **(03)**

$\therefore$ FeS_2 4 x 120 g $BaSO_4$ 8 x 233 g ලබා දෙයි **(03)**

$\therefore$ FeS_2 16 g $BaSO_4$ $\frac{8 \times 233}{4 \times 120} \times 16$ g ලබා දෙයි **(03)**

$BaSO_4$ හි සෛධාන්තික ස්කන්ධය $= 62.13$ g **(03)**

$BaSO_4$ හි පරීක්ෂණාත්මක ස්කන්ධය $= 31.13$ g

% පරිවර්තනය $= \frac{31.13}{62.13} \times 100$ **(03)**

$= 50.1\%$ **(04)**

(9b(ii): ලකුණු 25)

<u>විකල්ප පිළිතුර 01</u>

FeS_2 4 mol → H_2SO_4 8 mol → $BaSO_4$ 8 mol

යකඩ පයිරයිට් 20.0 g ක FeS_2 ස්කන්ධය = $20.0 \times \frac{80}{100}$ (03)

= 16.0 g (03)

$BaSO_4$ මවුල = $\frac{31.13}{233}$ mol

H_2SO_4 මවුල = $\frac{31.13}{233}$ mol (03)

ප්‍රතික්‍රියා කළ FeS_2 = $\frac{1}{2}$ X $\frac{31.13}{233}$mol (03)

පරීක්ෂණාත්මක ප්‍රතික්‍රියා කළ FeS_2 ස්කන්ධය = $\frac{1}{2}$ X $\frac{31.13}{233}$mol X 120 g mol^{-1} (03)

= 8.016 g (03)

% පරිවර්තනය = $\frac{8.016g}{16g}$ x 100% (03)

= 50.1% (04)

(9b(ii): ලකුණු 25)

<u>විකල්ප පිළිතුර 02</u>

FeS_2 4 mol → H_2SO_4 8 mol → $BaSO_4$ 8 mol

යකඩ පයිරයිට් 20.0g ක FeS_2 ස්කන්ධය = $20.0\ g \times \frac{80}{100}$ (03)

= 16.0 g (03)

FeS_2 මවුල = $\frac{16.0}{120}$ mol (03)

$BaSO_4$ හි සෛධාන්තික ස්කන්ධය = $\frac{16}{120}$ x 2 mol x 233 g mol^{-1} (03)

= 62.13 g (03)

$BaSO_4$ හි පරීක්ෂණාත්මක ස්කන්ධය = 31.13 g (03)

% පරිවර්තනය = $\frac{31.13g}{62.13g}$ x 100% (03)

= 50.1% (04)

(9b(ii): ලකුණු 25)

<u>විකල්ප පිළිතුර 03</u>

FeS_2 4 mol → H_2SO_4 8 mol → $BaSO_4$ 8 mol

යකඩ පයිරයිට් 20.0g ක FeS_2 ස්කන්ධය = $20.0\ g \times \frac{80}{100}$ (03)

= 16.0 g (03)

FeS_2 මවුල = $\frac{16.0}{120}$ mol (03)

H_2SO_4 හි සෛධාන්තික මවුල = $\frac{16}{120}$ x 2 mol

H_2SO_4 හි සෛධාන්තික ස්කන්ධය = $\frac{16}{120}$ x 2 mol x 98 g mol-1

= 26.13 g (03)

$BaSO_4$ මවුල = $\frac{31.13}{233}$ mol

H_2SO_4 මවුල = $\frac{31.13}{233}$ mol

H_2SO_4 හි පරීක්ෂණාත්මක ස්කන්ධය = $\frac{31.13}{233}$mol x 98 g mol-1 (03)

= 13.09 g (03)

% පරිවර්තනය = $\frac{13.09g}{26.13g}$x 100% (03)

= 50.1% (04)

(9b(ii): ලකුණු 25

(iii) ඌංඟු ක්ෂුද්‍රජීවීන් මඟින් අයන් පයිරයිට්වල ඇති FeS_2, SO_4^{2-} බවට පරිවර්තනය වන ප්‍රතිශතය 100% වන විට H_2SO_4 8 kg නිපදවීමට අවශ්‍ය වන අයන් පයිරයිට් ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.
(හාවේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ : O = 16, S = 32, Fe = 56, Ba = 137)

H_2SO_4 = 8 kg = 8000 g **(03)**

H_2SO_4 හි මවුලික ස්කන්ධය = 98 **(03)**

H_2SO_4 හි මවුල $= \frac{8000}{98}$ **(03)**

පරිවර්තනය 100% නම්

$\therefore$ අවශ්‍ය FeS_2 මවුල $= \frac{8000}{98} \times \frac{1}{2}$ **(03)**

$= 40.8$ mol **(03)**

$= 40.8 \times 120$ g

$= 4896$ g **(03)**

$\therefore$ H_2SO_4 කිලෝග්‍රෑම් 8 ක් නිපදවීමට අවශ්‍ය යකඩ පයිරයිට් ප්‍රමාණය $= \frac{4896}{80} \times 100$ g **(03)**

$= 6120$ g

$= 6.12$ kg **(04)**

(9b(iii): ලකුණු 25)

10. (*a*) පහත දී ඇති ප්‍රශ්න සොල්වේ ක්‍රියාවලිය මත පදනම් වේ.

(i) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන ඵලය කුමක් ද?

Na_2CO_3/ සෝඩියම් කාබනේට් **(04)**

(ii) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන අනුරුවලය කුමක් ද?

$CaCl_2$/ කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් **(04)**

(iii) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ යොදාගන්නා අමුද්‍රව්‍යයන් (ආරම්භක ද්‍රව්‍යයන්) මොනවා ද?

NH_3 වායුව, **(04)**

CO_2 වායුව **(04)**

බ්‍රයින් (මුහුදු ජලයෙන් ලබාගන්නා Ca^{2+}, Mg^{2+} හා SO_4^{2-} ඉවත් කරන ලද පිරිසිදු කළ සාන්ද්‍ර NaCl ද්‍රාවණයයි) **(04)**

(10a(iii): ලකුණු 12)

(iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් කුමන අමුද්‍රව්‍යය මෙම ක්‍රියාවලියේදී වැය නොවී, නැවත නැවතත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරෙන්නේ ද?

NH_3 වායුව **(04)**

(v) අමුද්‍රව්‍ය සවිවර මැටි තහඩුවලින් සමන්විත අටළුවක් තුළ මිශ්‍ර කරන සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ පළමු පියවර හඳුනාගන්න. මෙය පහළ උෂ්ණත්වයකදී සිදු කරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- ඇමෝනීකරණය (ප්‍රතිප්‍රවාහ මූලධර්මය භාවිතයෙන් NH_3 වායුව හා බ්‍රයින් ද්‍රාවණය මිශ්‍ර කිරීම) **(02)**
- ඇමෝණීකරණය තාපදායක ක්‍රියාවකි. **(03)**
- උෂ්ණත්වය වැඩි වුවහොත් NH_3 වායුව බ්‍රයින් ද්‍රවණයේ දියවීමේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ. එම නිසා පහළ උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගනී. **(03)**

හෝ

NH_3 වායුව දියවීම තාපදායක ($\Delta H < 0$) සහ (OI) **(01)**
එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය (ΔS) සෘණ වේ. ($\Delta S < 0$) **(01)**
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ අනුව, **(01)**
ΔS සෘණ වන විට $-T\Delta S$ හි අගය ධන අගයකි. **(01)**
උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට හි ΔG හි සෘණ අගය අඩුවේ. **(01)**
NH_3 වායුව දියවීමේ කාර්යක්ෂමතාව අඩුවේ. එම නිසා පහළ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම වඩා සුදුසුය **(03)**

(vi) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන ඵලයේ භාවිත **තුනක්** දෙන්න.

- ජලයේ කඨිනත්වය ඉවත් කිරීමට
- වීදුරු කර්මාන්තයේදී භාවිතා කෙරේ.
- කඩදාසි කර්මාන්තයේ දී භාවිතා කෙරේ.
- සබන් හා ක්ෂාලක නිපදවීමේදී ශෝධන ක්‍රියාව වර්ධනය කිරීමට
- ප්‍රබල පිරිසිදු කාරක (රෙදි සෝඩා) ලෙස භාවිතා කිරීම

(ඕනෑම තුනක් සඳහා ලකුණු 03 x 03 = ලකුණු 09)

(vii) සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ආර්ථික ලාභදායිත්වය සඳහා දායක වන හේතු **තුනක්** දෙන්න.

- NaCl හා $CaCO_3$ අඩු වියදමකින් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිවීම
- NH_3 වැය නොවන අතර චක්‍රිකරණය මගින් නැවත නැවතත් භාවිතා කළ හැකිවීම
- CO_2 වලින් කොටසක් ද නැවත භාවිතා කළ හැකිවීම

(ලකුණු 03 x 03 = ලකුණු 09)

(b) පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශනය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(i) කෘෂිකර්මය ගෝලීය උණුසුමට දායක වේ.

කෘෂිකර්මාන්තයේ දී,

- ගෝලීය උණුසුමට දායක වන $\underline{N_2O}$ **(ලකුණු 02)** හා $\underline{CH_4}$ **(ලකුණු 02)** වායු නිපදවයි.
- මෙම වායූන් දෙකම හරිතාගාර වායූන් වේ. **(02)**
- මෙම වායූන් හි සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම ගෝලීය උණුසුමට හේතු වේ. **(02)**

N_2O සෑදීම

- පොහොර වශයෙන් පසට එකතු කරන නයිට්‍රජන් සංයෝග මත **(02)**
- නයිට්‍රිහාරී බැකිටීරියා ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් N_2O නිපදවයි. **(02)**

CH_4 සෑදීම

- වගුරු බිම් සහ ජලයෙන් යට වූ ප්‍රදේශවල වී වගාව **(02)**
- කාබනික ද්‍රව්‍ය නිර්වායු වියෝජනය මගින් CH_4 නිපදවීමට හිතකර වේ. **(01)**
- අවිධිමත් ලෙස බැහැර කරන කාබනික ද්‍රව්‍ය දිරාපත් වීම. **(02)**
- නිර්වායු වියෝජනයට ලක් වී CH_4 නිපදවයි. **(01)**
- වමාරා කන සතුන්ගේ (එළදෙනුන්, එළුවන්, බැටළුවන්) බඩවැල්වල කාබනික/සෙලියුලෝස් ද්‍රව්‍ය ජීර්ණයේ දී සිදුවන නිර්වායු තත්වයන් යටතේ බැක්ටීරියා වියෝජනයේදී CH_4 නිපදවයි. **(02)**

(10b(i): ලකුණු 20)

(ii) යකඩ නිස්සාරණය ගෝලීය උණුසුමට දායක වේ.

යකඩ නිස්සාරණයට අදාළව:

- CO_2 ගෝලීය උණුසුමට දායක වේ
- CO_2 හරිතාගාර වායුවක් වන අතර
- සාන්ද්‍රණය වැඩිවීම ගෝලීය උණුසුමට දායක වේ

(02x3)

CO_2 සෑදීම:

යකඩ නිස්සාරණය සඳහා භාවිතා කරන පොසිල ඉන්ධන සහ කෝක් දහනය කිරීමේදී CO_2 බවට පරිවර්තනය වේ **(04)**

(10b(ii): ලකුණු 10)

(iii) ප්‍රවාහනය ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවට දායක වේ.

ඉහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශයේ දී ඇති පාරිසරික ආවරණවලට වඩාකිට යුතු රසායනික විශේෂය/විශේෂ සැදෙන්නේ කෙසේදැයි ඔබගේ පිළිතුරෙහි දක්වන්න.

ප්‍රවාහනයට අදාළව:

ප්‍රකාශ රසායනික දුමාරයට දායක වන විශේෂ

NO සහ වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන ($CH_3(CH_2)_nCH_3$, n = 1-4) **(02x2)**

- NO සහ වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන සූර්යාලෝකය හමුවේ ප්‍රතික්‍රියා වලට භාජනය වී වාෂ්පශීලී කෙටි දාම ඇල්ඩිහයිඩ සහ අනෙකුත් විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය (PAN, PBN) නිපදවයි
- වායුගෝලයේ අවලම්බනය වන අංශු නිපදවීම සඳහා ඇල්ඩිහයිඩ තවදුරටත් බහුඅවයවීකරණය වේ
- මෙම අංශු දූවිලි, ජල වාෂ්ප ආදිය තැන්පත් වීමෙන් විශාල අංශු සෑදිය හැක
- මෙම විශාල අංශු මගින් වායුගෝලයේ පාරදෘශ්‍යතාව/විනිවිදභාවය අඩු කරමින් සූර්ය ආලෝකය ප්‍රකිරණය කළ හැකි අතර පහළ වායුගෝලයේ මීදුමක් මෙන් දිස් වේ

(02 x 8 = 16)

(10b(iii): ලකුණු 20)

10(b): ලකුණු 50

(c) (i) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න විනාකිරි නිෂ්පාදනය මත පදනම් වේ.

I. ස්වභාවික විනාකිරි නිෂ්පාදනයේදී භාවිත කරන ක්‍රියාවලිය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය / ක්ෂුද්‍රජීවී පැසවීම **(04)**

II. ස්වභාවික විනාකිරිවල අඩංගු ක්‍රියාකාරී රසායනික සංඝටකයේ (active chemical ingredient) නම ලියන්න.

ඇසිටික් අම්ලය **(04)**

III. ස්වභාවික විනාකිරිවල අඩංගු ක්‍රියාකාරී රසායනික සංඝටකය ප්‍රමාණාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීමේදී යොදාගන්නා අනුමාපකය සහ දර්ශකය නම් කරන්න.

අනුමාපකය - NaOH **(04)**

දර්ශකය - පිනෝප්තලීන් (Phenolphthalein) **(04)**

IV. ස්වභාවික විනාකිරි සහ කෘත්‍රිම විනාකිරිවල සංයුති අතර වෙනස කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

ස්වාභාවික විනාකිරි වල ලවණ, සරල සීනි, එස්ටර සහ මධ්‍යසාර කුඩා ප්‍රමාණවලින් අඩංගු වේ. **(01x4)**

කෙසේ වෙතත්, කෘතිම විනාකිරි වල අඩංගු වන්නේ ඇසිටික් අම්ලය පමණි. **(02)**

(ii) පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ඖෂධවලින් සුගන්ධ තෙල් නිස්සාරණය මත පදනම් වේ.

I. සුගන්ධ තෙල් නිස්සාරණයට භාවිත කළ හැකි ක්‍රම **තුනක්** නම් කරන්න.

හුමාල ආසවනය
ද්‍රාවක නිස්සාරණය
තෙරපීම

(ලකුණු 04 x 3 = ලකුණු 12

II. ඉහත ක්‍රමවලින් ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමය යෙදීම මත පදනම් වූ ක්‍රමය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

හුමාල ආසවනය **(ලකුණු 04**

III. පහත සඳහන් එක් එක් ඖෂධ තෙලෙහි අඩංගු ප්‍රධාන සංයෝගය නම් කරන්න.

- පැඟිරි තෙල් (Citronella oil)
- කුරුඳු මුල් තෙල්
- කුරුඳු පතු තෙල්

පැඟිරි තෙල් - ජෙරනියෝල්
කුරුඳු මූල - කැම්පර්
කුරුඳු කොළ - ඉයුජිනෝල් **(ලකුණු 04 x 3 = ලකුණු 12)**

10(c): ලකුණු 50

***