

අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය - 2025

10 - සංයුක්ත ගණිතය I

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

I පත්‍රය

$$A \text{ කොටස} = 10 \times 25 = 250$$

$$B \text{ කොටස} = 05 \times 150 = 750$$

$$\text{එකතුව} = \frac{1000}{10}$$

$$\text{අවසන් ලකුණ} = 100$$

A කොටස

1. ගණිත අභ්‍යුහන මූලධර්මය භාවිතයෙන්, සියලු $n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $9(2^n) < (n+3)!$ බව සාධනය කරන්න.

$n=1$ සඳහා ව.පැ. $= 9 \cdot 2^1 = 18$ හා ද.පැ. $= 4! = 24$ බැවින් ව.පැ. $<$ ද.පැ. වේ.
ලැබෙන ප්‍රතිඵලය

$\therefore n=1$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ. (5)

ඕනෑම ධන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක k ගෙන, ප්‍රතිඵලය

$n=k$ සඳහා සත්‍ය යැයි උපකල්පනය කරමු.

එනම් $9 \cdot 2^k < (k+3)!$ වේ. (5)

$\therefore 9 \cdot 2^{k+1} < 2 \cdot (k+3)!$ (5) *ලැබෙන ප්‍රතිඵලය*

$< (k+4)(k+3)!$
 $= (k+4)!$ (5)

($\because 2 < k+4$)
ආශ්‍රිත

එබැවින් $9 \cdot 2^{k+1} < (k+4)!$ වේ.


ඒ නයින්, $n=k$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය නම් $n=k+1$ සඳහා ද ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වේ.

$n=1$ සඳහා ප්‍රතිඵලය සත්‍ය බව සාධනය කර ඇත.

ඒ නයින්, ගණිතමය අභ්‍යුහන මූලධර්මය මගින් ප්‍රතිඵලය

සියලු $n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහාම සත්‍ය වේ. (5)

2. එකම රූප සටහනක $y=|x-2|+2$ හා $y=7-|x+3|$ හි ප්‍රස්ථාරවල දළ සටහන් අඳින්න.
එ හෙයින්, $|x-2|+|x+3|=5$ සමීකරණය විසඳන්න.




$$|x-2|+|x+3|=5$$

$$\Leftrightarrow |x-2|+2=7-|x+3|. \quad (5)$$

$$\text{රූප සටහනෙන්, } -3 \leq x \leq 2. \quad (5)$$

3. ආගන්තික සටහනක, $|\operatorname{Arg}(z - 2i)| = \frac{\pi}{4}$ සමීකරණය සපුරාලන z සංකීර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන ලක්ෂ්‍යව, පර්යේෂිත දළ සටහනක් අඳින්න.
එ සමීකරණයේ අන් අග්‍රහණය, $|\operatorname{Arg}(\bar{z} + 2i)| = \frac{\pi}{4}$ සපුරාලන z සඳහා $|z - 1|$ හි අවම අගය සොයන්න.



$$\left. \begin{aligned} |\operatorname{Arg}(\bar{z} + 2i)| &= |\operatorname{Arg}(\overline{z - 2i})| \\ &= |\operatorname{Arg}(z - 2i)| \end{aligned} \right\}$$

(5)

මෙම සමීකරණයේ
ප්‍රතිඵලයක් ලෙස
ලබා ඇත්තේ
සමීකරණ (10)
සමීකරණ (10)

$$\therefore |\operatorname{Arg}(\bar{z} + 2i)| = \frac{\pi}{4} \text{ යන්න හා } |\operatorname{Arg}(z - 2i)| = \frac{\pi}{4} \text{ යන්න එකම වේ.}$$

$$\text{අවශ්‍ය අවමය} = 1 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10)$$

4. $n \in \mathbb{Z}^+$ ඔත්තේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් යැයි ගනිමු. $\left(\sqrt{x} - \frac{x}{n}\right)^n$ හි ද්විපද ප්‍රසාරණයෙහි x^2 පදයක් අන්තර්ගත වන බව දී ඇත. $n = 3$ බව පෙන්වා, x^2 හි සංගුණකය සොයන්න.

$$\left(\sqrt{x} - \frac{x}{n}\right)^n = x^{\frac{n}{2}} \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{n}\right)^n$$

$$= x^{\frac{n}{2}} \sum_{r=0}^n {}^nC_r (-1)^r \frac{x^{\frac{r}{2}}}{n^r}$$

(5) හෝ සාධාරණ පදය.

$$= \sum_{r=0}^n \frac{(-1)^r}{n^r} {}^nC_r x^{\frac{n+r}{2}}$$

ලැබෙන්නේ මෙයයි.

අපට $\frac{n+r}{2} = 2$ වීම අවශ්‍ය වේ. (5)

$$\therefore n+r=4.$$

මෙයින් $n \leq 4$ ලැබේ.

$n \in \mathbb{Z}^+$ ඔත්තේ බැවින් $n=1$ හෝ $n=3$ විය යුතු ය. (5)

$n=1$ නම් $r=3$ වන අතර $r \leq n$ බැවින් මෙය විය නොහැක.

$n=3$ නම් $r=1$ වන අතර මෙය අවශ්‍යතා තෘප්ත කරයි.

$$\therefore n=3. \quad (5)$$

$$x^2 \text{ හි සංගුණකය} = \frac{(-1)}{3} {}^3C_1 = -1. \quad (5)$$

-1 ගුණකය.

$$\frac{n}{2} - \frac{r}{2} = 2$$

$$3 - r = 4$$

වෙනත් ක්‍රමයක්

$$\left(\sqrt{x} - \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{r=0}^n {}^nC_r x^{\frac{r}{2}} \frac{(-1)^{n-r}}{n^{n-r}} x^{n-r} \quad (5) \quad \text{හෝ සාධාරණ පදය}$$

$$= \sum_{r=0}^n \frac{(-1)^{n-r}}{n^{n-r}} {}^nC_r x^{\frac{r}{2}}$$

අපට $n - \frac{r}{2} = 2$ වීම අවශ්‍ය වේ. (5)

$$\therefore r = 2n - 4.$$

$r \leq n$ බැවින් $n \leq 4$ අපට ලැබේ.

$n \in \mathbb{Z}^+$ ඔත්තේ බැවින් $n=1$ හෝ $n=3$ විය යුතුය. (5)

$n=1$ නම් $r=-2$ වන අතර මෙය විය නොහැක.

$n=3$ නම් $r=2$ වන අතර මෙය අවශ්‍යතා තෘප්ත කරයි.

$\therefore n=3.$ (5) *හෙයින් නිසි වේ*

$$x^2 \text{ හි සංගුණකය} = \frac{(-1)^3}{3} {}^3C_2 = -1. \quad (5)$$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(\sqrt{3x^2+1} - \sqrt{x^2+1})} = \frac{1}{2}$ බව පෙන්වන්න.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(\sqrt{3x^2+1} - \sqrt{x^2+1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(\sqrt{3x^2+1} - \sqrt{x^2+1})} \cdot \frac{(\sqrt{3x^2+1} + \sqrt{x^2+1})}{(\sqrt{3x^2+1} + \sqrt{x^2+1})} \quad (5) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{(1 - \cos x)}{2x^2} \cdot \frac{(\sqrt{3x^2+1} + \sqrt{x^2+1})}{\cos x} \quad (5) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} \cdot \frac{(\sqrt{3x^2+1} + \sqrt{x^2+1})}{4\cos x} \quad (5) \quad \text{හා } (5') \\ &= 1 \times 1^2 \times \frac{2}{4} \quad (5) \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$\sin^3 x$

6. $k > 0$ යැයි ගනිමු. $y = (e^{kx} - e^{-kx})^2 \sqrt{e^{kx} + e^{-kx}}$, $y = 0$, $x = -\frac{1}{k}$ හා $x = \frac{1}{k}$ වක්‍ර මගින් ආවර්ත වන පෙරළි x -අක්ෂය වටා රේඛීය 2π චලිත භ්‍රමණය කරනු ලැබේ. මෙලෙස ජනනය වන සහ වස්තුවේ පරිම $\frac{2\pi}{5k} \left(e - \frac{1}{e}\right)^5$ බව පෙන්වන්න.

$$\text{අවශ්‍ය පරිමාව} = \pi \int_{-\frac{1}{k}}^{\frac{1}{k}} (e^{kx} - e^{-kx})^4 (e^{kx} + e^{-kx}) dx \quad (5)$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{1}{k}} (e^{kx} - e^{-kx})^4 (e^{kx} + e^{-kx}) dx$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{1}{k}} \frac{u^4}{k} du \quad (5)^*$$

$$= 2\pi \frac{u^5}{5k} \Big|_0^{\frac{1}{k}} \quad (5)^*$$

$$= \frac{2\pi}{5k} \left(e - \frac{1}{e}\right)^5. \quad (5)$$

$$u = e^{kx} - e^{-kx} \text{ යැයි ගනිමු. } (5)$$

$$\text{එවිට } \frac{du}{dx} = k(e^{kx} + e^{-kx}) \text{ වේ.}$$

$$x = \frac{1}{k} \text{ සඳහා } u = e - \frac{1}{e}.$$

$$x = 0 \text{ සඳහා } u = 0.$$

$[f(x)]^x f'(x)$

$$\left(\frac{e^{kx} - e^{-kx}}{5k} \right)^5 \text{ වස්තුවේ ඉහළ ක්ෂේත්‍රය } 15 \text{ වේ.}$$

7. $t \in \mathbb{R}$ සඳහා $x = e^t - 2e^{-t}$ හා $y = 2e^t + e^{-t}$ මගින් පරාමිතිකව දෙන ලබන චක්‍රය C යැයි ගනිමු.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2e^{2t} - 1}{e^{2t} + 2} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

C චක්‍රයට එය මත $x = 1$ ට අනුරූප ලක්ෂ්‍යයේදී වූ ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය සොයන්න.

$$x = e^t - 2e^{-t} \text{ හා } y = 2e^t + e^{-t}.$$

$$\frac{dx}{dt} = e^t + 2e^{-t} \text{ හා } \frac{dy}{dt} = 2e^t - e^{-t}. \quad (5) \text{ දෙකම}$$

$$\text{දැන්, } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2e^t - e^{-t}}{e^t + 2e^{-t}}$$

$$= \frac{2e^{2t} - 1}{e^{2t} + 2}. \quad (5)$$

$$x = 1 \text{ විට } 1 = e^t - 2e^{-t} \text{ වේ.} \quad (5)$$

$$\text{එනම් } e^{2t} - e^t - 2 = 0 \text{ වේ.}$$

$$\therefore (e^t + 1)(e^t - 2) = 0$$

$$\therefore e^t = 2 \quad (\because e^t + 1 > 0) \quad (5)$$

$$\therefore t = \ln 2.$$


$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\ln 2} = \frac{2 \times 2^2 - 1}{2^2 + 2} = \frac{7}{6}. \quad (5)$$

$$\therefore \text{අවශ්‍ය අනුක්‍රමණය} = \frac{7}{6}.$$

$e^t = -1$ විය හැකිය
ලියා ඇති $e^t = 2$ වූයේ
ල. 5 ඇත්ත.

$e^t = -1$ ලියා ඇත්තේ නිසි නොවේ
හොඳින් ලියා තිබේ ඉතා

8. $P \equiv (2, \alpha)$ හා $Q \equiv (1, \beta)$ යැයි ගනිමු; මෙහි $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ වේ. P ලක්ෂ්‍යය $l_1: 2x - y - 1 = 0$ රේඛාව මත. Q ලක්ෂ්‍යය, l_1 රේඛාවට සමාන්තර වූ l_2 සරල රේඛාව මත ද පිහිටා ඇත්තේ PQ හා l_2 අතර සුළු කෝණය $\frac{\pi}{4}$ වන පරිදි ය. α හා β හි අගයන් සොයන්න.



$P = (2, \alpha)$ ලක්ෂ්‍යය l_1 මත බැවින් $4 - \alpha - 1 = 0$ වේ.

$$\therefore \alpha = 3. \quad (5)$$

PQ හි බෑවුම $= \alpha - \beta$.

l_1 හා l_2 සමාන්තර බැවින් l_2 හි බෑවුම $= 2$ වේ.

PQ හා l_2 අතර සුළු කෝණය $\frac{\pi}{4}$ බැවින්,

$$\left| \frac{\alpha - \beta - 2}{1 + 2(\alpha - \beta)} \right| = \tan \frac{\pi}{4} = 1 \text{ වේ.} \quad (5)$$

$$\therefore |1 - \beta| = |7 - 2\beta|$$

$$\therefore 1 - \beta = 7 - 2\beta \text{ හෝ } 1 - \beta = -7 + 2\beta$$

$$\therefore \beta = 6 \text{ හෝ } \beta = \frac{8}{3}.$$

(5)

(5)

මෙම ලේඛනය
ලියා ඇත්තේ
ල. 5 හි ඇත්ත
1 / තත්ත්ව
ල. 5 තුළ

9. අරය එකක 4 ක් වන, කේන්ද්‍ර $4x - 3y = 0$ රේඛාව මත පිහිටන හා $x^2 + y^2 = 1$ වෘත්තය බාහිරව ස්පර්ශ කරන වෘත්තවල සමීකරණ සොයන්න.

අවශ්‍ය වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය (a, b) යැයි ගනිමු.

එහි අරය = 4.

මෙම කේන්ද්‍රය $4x - 3y = 0$ මත බැවින් $4a - 3b = 0$ වේ. (5)

$$\therefore b = \frac{4a}{3}.$$

මෙම වෘත්තය, $x^2 + y^2 = 1$ වෘත්තය බාහිරව ස්පර්ශ කරන බැවින්,

කේන්ද්‍ර අතර දුර = අරයයන්ගේ එකතුව විය යුතු ය. ----- (1)

$x^2 + y^2 = 1$ වෘත්තයෙහි කේන්ද්‍රය $(0, 0)$ හා එහි අරය 1 වේ. (5) *එම නිසා දුර 5 වේ.*

දැන් (1) න් $\sqrt{a^2 + b^2} = 4 + 1$ අපට ලැබේ. (5)

$$\therefore a^2 + \left(\frac{4a}{3}\right)^2 = 5^2$$

$\therefore a^2 = 9$ හා එබැවින් $a = \pm 3$ වේ. (5)

$a = 3$ විට $b = 4$, හා $a = -3$ විට $b = -4$ වේ.

*එම නිසා අවසන් ලබා
දෙන දුර 5 වේ.
ලබා ඇත්තේ (5) ද ඇත.*

පිළිතුර:
$$\left. \begin{aligned} (x-3)^2 + (y-4)^2 &= 16 \\ (x+3)^2 + (y+4)^2 &= 16 \end{aligned} \right\} (5)$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 - 8y + 16 = 16$$

$$x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$$

$$x^2 + 6x + 9 + y^2 + 8y + 16 = 16$$

$$x^2 + y^2 + 6x + 8y + 9 = 0$$

10. $\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta$ යන්න $R \sin(\theta - \alpha)$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි $R > 0$ හා $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ වේ.
එ නමින්, $\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta$ ට එහි අවම අගය නිවැරදි වූ θ හි අගයන් සොයන්න.

$$\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta = 2 \left\{ \frac{1}{2} \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \right\} \quad (5)$$

$$= 2 \left\{ \cos \frac{\pi}{3} \sin \theta - \sin \frac{\pi}{3} \cos \theta \right\} \quad (5)$$

$$= 2 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right). \quad (5)$$

$$R = 2 \text{ හා } \alpha = \frac{\pi}{3}.$$

$\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta$ හි අවමය -2 වන අතර,

$$\text{එය ලැබෙන්නේ } \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) = -1 \text{ විටය.} \quad (5)$$

$$\sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) = \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right)$$

$$\theta - \frac{\pi}{3} = n\pi + (-1)^n \left(-\frac{\pi}{2} \right); \text{ මෙහි } n \in \mathbb{Z}. \quad (5)$$

$$\theta = n\pi + \frac{\pi}{3} - (-1)^n \frac{\pi}{2}; \text{ මෙහි } n \in \mathbb{Z}.$$

B කොටස

11. (a) $x \in \mathbb{R}$ සඳහා $f(x) = x^2 - 2kx - k^2 - 1$ යැයි ගනිමු; මෙහි $k \in \mathbb{R}$ වේ.

$f(x) = 0$ සමීකරණයට ගුණානා තෝරා තෘතීයික හා ප්‍රතිත්ත මූල දෙකක් ඇති බව පෙන්වන්න.

α හා β යනු $f(x) = 0$ හි මූල යැයි ද, $r = \frac{1}{2\alpha}$ හා $s = \frac{1}{2\beta}$ යැයි ද ගනිමු.

r හා s මූල ලෙස ඇති වර්ග සමීකරණය $4(k^2 + 1)x^2 + 4kx - 1 = 0$ බව හා $|r - s| = \frac{\sqrt{2k^2 + 1}}{k^2 + 1}$ බව පෙන්වන්න.

$y = x^3 + 9x^2 + 3x + 1$ හා $y = x^3 + x^2 - x + 2$ හි ප්‍රස්ථාරවල ඡේදන ලක්ෂ්‍ය දෙක අතර තිරස් දුර $\frac{\sqrt{3}}{2}$ බව අපෝහනය කරන්න.

(b) (i) $a \in \mathbb{R}$ යැයි ගනිමු. $(x - a)$ යන්න $p(x)$ බහුපදයක සාධකයක් නම්, $p(x) - (x - a)p'(x) = (x - a)^2 s(x)$ වන පරිදි $s(x)$ බහුපදයක් පවතින බව පෙන්වන්න; මෙහි $p'(x)$ යනු $p(x)$ හි ව්‍යුත්පන්නය වේ.

(ii) $x \in \mathbb{R}$ සඳහා $g(x) = x^3 - \lambda x^2 - 2x - (x - 2)(3x^2 + \mu x - 2)$ යැයි ගනිමු; මෙහි $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ වේ. $(x - 2)$ යන්න $g(x)$ හි සාධකයක් බව ද $(x - 1)$ මගින් $g(x)$ බෙදූ විට ශේෂය -3 බව ද දී ඇත. $\lambda = 1$ හා $\mu = -2$ බව පෙන්වන්න.

ඉහත (i) භාවිතයෙන්, $(x - 2)^2$ යන්න $g(x)$ හි සාධකයක් බව අපෝහනය කරන්න.

(a) $f(x) = x^2 - 2kx - k^2 - 1$

විචලනය $\Delta = (-2k)^2 - 4(-k^2 - 1)$ (5)

$= 8k^2 + 4 \geq 0$ ($\because k \in \mathbb{R}$)

(5) බැර සාධක

$\therefore f(x) = 0$ ට තෘතීයික ප්‍රතිත්ත මූල දෙකක් ඇත. (5)

තවද, මූලවල ගුණිතය $-(k^2 + 1) \neq 0$.

(5)

$\therefore f(x) = 0$ හි මූල නිශ්ශුන්‍ය වේ. (5)

25

r හා s මූල ලෙස ඇති වර්ගජ සමීකරණය $x^2 - (r+s)x + rs = 0$ වේ. ----- (1)

$$\text{ඇත් } r+s = \frac{1}{2\alpha} + \frac{1}{2\beta} = \frac{\alpha+\beta}{2\alpha\beta}. \quad (5)$$

$$\alpha + \beta = 2k \quad \text{හා} \quad \alpha\beta = -(k^2+1) \text{ වේ.}$$

$$\therefore r+s = \frac{2k}{-2(k^2+1)} = -\frac{k}{(k^2+1)}. \quad (5)$$

$$\text{තවද } rs = \frac{1}{4\alpha\beta} = -\frac{1}{4(k^2+1)}. \quad (5)$$

$$\therefore (1), \quad x^2 + \frac{k}{(k^2+1)}x - \frac{1}{4(k^2+1)} = 0 \text{ බවට පත්වේ.}$$

$$\text{එනම් } 4(k^2+1)x^2 + 4kx - 1 = 0.$$

$$|r-s| = \left| \frac{1}{2\alpha} - \frac{1}{2\beta} \right| = \frac{|\alpha-\beta|}{2|\alpha\beta|}. \quad (2)$$

$$(\alpha-\beta)^2 = (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$$= (2k)^2 + 4(k^2+1) \quad (5)$$

$$= 8k^2 + 4.$$

$$\therefore |\alpha-\beta| = 2\sqrt{2k^2+1}. \quad (5)$$

$$(2) \Rightarrow |r-s| = \frac{2\sqrt{2k^2+1}}{2(k^2+1)} = \frac{\sqrt{2k^2+1}}{(k^2+1)}. \quad (5)$$

පේදන ලක්ෂ්‍යයන්හි x - ඛණ්ඩාංක

$$x^3 + 9x^2 + 3x + 1 = x^3 + x^2 - x + 2 \text{ හි විසඳුම් වේ.} \quad (5)$$

මෙයින් අපට $8x^2 + 4x - 1 = 0$ ලැබේ.

$$\text{මෙය } k=1 \text{ විට } 4(k^2+1)x^2 + 4kx - 1 = 0 \text{ ම වේ.} \quad (5)$$

$\therefore$ අවශ්‍ය දුර $= |r-s|$; මෙහි $k=1$ වේ.

$$= \frac{\sqrt{2+1}}{1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad (5)$$

(b) (i) $(x-a)$ යනු $p(x)$ හි සාධකයක් යැයි ගනිමු.

එවිට $p(x) = (x-a)q(x)$; මෙහි $q(x)$ යනු බහුපදයකි. (5)

$$\therefore p'(x) = q(x) + (x-a)q'(x). \quad (5)$$

$$\text{එ නිසින්, } p(x) - (x-a)p'(x) = p(x) - (x-a)q(x) - (x-a)^2q'(x)$$

$$= -(x-a)^2q'(x) \quad (5)$$

$$= (x-a)^2s(x); \text{ මෙහි } s(x) = -q'(x) \text{ යනු බහුපදයකි.}$$

(5)

20

$$(ii) \quad g(2) = 0 \Rightarrow 8 - 4\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = 1. \quad (5)$$

$$g(1) = -3 \Rightarrow 1 - \lambda - 2 + 3 + \mu - 2 = -3 \Rightarrow \mu = -2 \quad (5)$$

20

$$p(x) = x^3 - x^2 - 2x \text{ ලෙස ගන්න. එවිට } p'(x) = 3x^2 - 2x - 2 \text{ වේ.}$$

$$(5) \quad p(2) = 2^3 - 2^2 - 2 = 0$$

$$\therefore g(x) = p(x) - (x-2)p'(x). \quad (5)$$

(i) න්, $g(x) = (x-2)^2q(x)$; මෙහි $q(x)$ යනු බහුපදයකි.

$$\therefore (x-2)^2 \text{ යන්න } g(x) \text{ හි සාධකයක් වේ.} \quad (5)$$

15

වෙනත් ක්‍රමයක්

(i) න්, $g(x) - (x-2)g'(x) = (x-2)^2s(x)$; මෙහි $s(x)$ බහුපදයකි. (5)

$$\therefore g(x) - (x-2)[3x^2 - 2x - 2 - (x-2)(6x-2) - (3x^2 - 2x - 2)] = (x-2)^2s(x)$$

$$\therefore g(x) = (x-2)^2(s(x) + 6x - 2)$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 \text{ is a factor of } g(x) \quad (5)$$

15

12. (a) එකිනෙකින් වෙනස් පොත් පහක්, A , B හා C යන සිසුන් තිදෙනෙකු අතරේ බෙදා දිය යුතුව ඇත.

(i) A ව හරියවම පොත් 2 කුත්, B ව හරියවම පොත් 2 කුත් හා C ව හරියවම 1 පොතකුත්,

(ii) එක් එක් සිසුවාට අවම වශයෙන් 1 පොතක්

ලැබිය හැකි වෙනස් විධි ගණන සොයන්න.

(b) $r \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $U_r = \frac{7r+4}{r(r+1)(r+2)}$, $f(r) = \frac{A}{r}$ හා $g(r) = \frac{B}{r+1}$ යැයි ගනිමු; මෙහි A හා B තාත්ව නියත වේ.

$r \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $U_r = [f(r) - f(r+2)] + [g(r) - g(r+1)]$ වන පරිදි A හා B හි අගයන් සොයන්න.

එ නමුත්, $n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහා $\sum_{r=1}^n U_r = \frac{9}{2} - \frac{2}{n+1} - \frac{5}{n+2}$ බව පෙන්වන්න.

තවද, $\sum_{r=1}^{\infty} U_r$ අපරිමිත ශ්‍රේණිය අභිසාරී බව පෙන්වා එහි අවසානය සොයන්න.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{r=1}^{2n} U_r + m \sum_{r=1}^{n-1} U_{n-r} \right) = 18$ වන පරිදි m කාන්ත්වක නියතයෙහි අගය සොයන්න.

(a) (i)

A	B	C
2	2	1

$$\text{පිළිතුර} = {}^5C_2 \times {}^3C_2 \times {}^1C_1 \quad (5)$$

$$= \frac{5!}{2!3!} \times 3 \times 1 = 10 \times 3 = 30 \quad (5)$$

(ii)

A	B	C
2	2	1
2	1	2
1	2	2
3	1	1
1	3	1
1	1	3

වෙනස් ආකාර ගණන

$${}^5C_2 \times {}^3C_2 \times {}^1C_1 = 30$$

(5)

$${}^5C_2 \times {}^3C_1 \times {}^2C_2 = 30$$

(5)

$${}^5C_1 \times {}^4C_2 \times {}^2C_2 = 30$$

(5)

$${}^5C_3 \times {}^2C_1 \times {}^1C_1 = 20$$

(5)

$${}^5C_1 \times {}^4C_3 \times {}^1C_1 = 20$$

(5)

$${}^5C_1 \times {}^4C_1 \times {}^3C_3 = 20$$

(5)

$$30 \times 3 + 20 \times 3$$

$$150$$

$$150 \text{ නිවැරදි නිසි} \\ \text{එය } \approx 35 \text{ වේ}$$

$$\text{මුළු වෙනස් ආකාර ගණන} = 90 + 60 = 150. \quad (5)$$

35

(b)

$$u_r = \frac{7r+4}{r(r+1)(r+2)}, \quad f(r) = \frac{A}{r}, \quad g(r) = \frac{B}{r+1}.$$

$$u_r = [f(r) - f(r+2)] + [g(r) - g(r+1)]$$

$$\Leftrightarrow \frac{7r+4}{r(r+1)(r+2)} = \left(\frac{A}{r} - \frac{A}{r+2} \right) + \left(\frac{B}{r+1} - \frac{B}{r+2} \right) \quad (10) / 0$$

$$\Leftrightarrow 7r+4 = A(r+1)(r+2) - (A+B)r(r+1) + Br(r+2)$$

$$\Leftrightarrow 7r+4 = (2A+B)r + 2A \quad \text{for } r \in \mathbb{Z}^+. \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow 2A + B = 7 \quad \text{and} \quad 2A = 4$$

$$\Leftrightarrow \quad A = 2 \quad \text{and} \quad B = 3$$

(5)

(5)

$$\text{ආරම්භක අගයයන් සමාන වීම} \\ \text{නිසි අගයයන් සමාන වීම}$$

25

$$\therefore f(r) = \frac{2}{r} \quad \text{හා} \quad g(r) = \frac{3}{r+1}.$$

සෑදීම
(5)

$$\text{දැන්, } U_1 = f(1) - \cancel{f(2)} + g(1) - \cancel{g(2)}$$

$$U_2 = f(2) - \cancel{f(3)} + \cancel{g(2)} - g(3) \quad (10)$$

$$U_3 = \cancel{f(3)} - \cancel{f(4)} + \cancel{g(3)} - \cancel{g(4)}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$U_{n-2} = \cancel{f(n-2)} - \cancel{f(n)} + \cancel{g(n-2)} - \cancel{g(n-1)}$$

$$U_{n-1} = \cancel{f(n-1)} - f(n+1) + \cancel{g(n-1)} - \cancel{g(n)} \quad (10)$$

$$U_n = \cancel{f(n)} - f(n+2) + \cancel{g(n)} - g(n+1)$$

$$\therefore \sum_{r=1}^n u_r = f(1) + f(2) - f(n+1) - f(n+2) + g(1) - g(n+1) \quad (10)$$

$$= \frac{2}{1} + \frac{2}{2} - \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2} + \frac{3}{2} - \frac{3}{n+2} \quad (5)$$

$$= \frac{9}{2} - \frac{2}{n+1} - \frac{5}{n+2} \quad (5)$$

40

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n u_r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{9}{2} - \frac{2}{n+1} - \frac{5}{n+2} \right)$$

සීමාව
→ (5)

$$= \frac{9}{2} \leftarrow (5)$$

$$\therefore \sum_{r=1}^{\infty} u_r \text{ අභිසාරී වන අතර එහි ඵලය } \frac{9}{2} \text{ වේ. } (5)$$

15

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{r=1}^{2n} u_r + m \sum_{r=1}^{n-1} u_{n-r} \right) = 18$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^{2n} u_r + m \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^{n-1} u_r = 18$$

$$\Leftrightarrow \frac{9}{2} + m \times \frac{9}{2} = 18 \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow m = 3. \quad (5)$$

$$m \sum_{r=1}^{n-1} u_{n-r} = m \sum_{r=1}^{n-1} u_r$$

reverse order බව දැකීම

11

13.(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & a \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & a \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ හා $C = \begin{pmatrix} 4+a & 7 \\ 6 & 7 \\ 3a & 4 \end{pmatrix}$ යැයි ගනිමු; මෙහි $a \in \mathbb{R}$ වේ.

A^{-1} පවතින පරිදි a හි අගයන් සොයන්න.

a ඇසුරෙන් AB සොයන්න.

$B^T A^T = C$ වන පරිදි a හි අගය නිර්ණය කරන්න.

a හි මෙම අගය සඳහා, $A - A^{-1} = 3I$ බව පෙන්වන්න; මෙහි I යනු ගණය 2 වූ ඒකක න්‍යාසය වේ.

(b) $w = -\frac{\sqrt{2}(3+i)}{(1+2i)}$ යැයි ගනිමු. $|w| = 2$ හා $\text{Arg } w = \frac{3\pi}{4}$ බව පෙන්වන්න.

$|z| = 2$ හා $\text{Arg } z = \frac{\pi}{3}$ වන පරිදි $z \in \mathbb{C}$ යැයි ගනිමු.

තවද, ආගන්තික සටහනක් මත A හා B යනු, පිළිවෙළින් z හා w සංකීර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන ලක්ෂ්‍ය යැයි ගනිමු. $AB^2 = 8 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{6}$ බව පෙන්වන්න.

AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය C යැයි ගනිමු. AOC ත්‍රිකෝණය භාවිතයෙන් $\sin^2\left(\frac{5\pi}{24}\right) = \frac{1}{8}(4 + \sqrt{2} - \sqrt{6})$ බව අපේක්ෂා කරන්න; මෙහි O මූල ලක්ෂ්‍යය වේ.

(c) $m \in \mathbb{Z}^+$ යැයි ගනිමු. $(1 + \sqrt{3}i)^{3m}(1 + i)^8 = 2^{3m+4}$ බව දී ඇත.

m හි අඩුතම අගය සොයන්න.

$$(a) \quad A^{-1} \text{ පවති} \Leftrightarrow |A| \neq 0 \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow 2 - 3a \neq 0$$

$$\Leftrightarrow a \neq \frac{2}{3} \quad (5)$$

10

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 2 & a \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & a \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4+a & 2+4a & 3a \\ 7 & 7 & 3a+1 \end{pmatrix} \quad (10) \end{aligned}$$

10

$$\begin{aligned} B^T A^T &= C \\ \Leftrightarrow (AB)^T &= C \quad (10) \\ \begin{pmatrix} 4+a & 7 \\ 2+4a & 7 \\ 3a & 3a+1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4+a & 7 \\ 6 & 7 \\ 3a & 4 \end{pmatrix} \quad (5) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 2+4a=6 \text{ හා } 3a+1=4$$

$$\Leftrightarrow a=1. \quad (5)$$

A^T හි B^T ලෙසට (5)
 $A^T B^T$ ගන්න (5)

20

$$a=1 \text{ සඳහා, } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{ඇත්, } A^{-1} = \frac{1}{(2-3)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad (10) / 0$$

$$\begin{aligned} \therefore A - A^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 3I \quad (5) \end{aligned}$$

$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ ප්‍රධාන අංකය 0 බව පෙන්වන්න
එ.විට A^{-1} අපේක්ෂා කළ පරිදි
 A^{-1} ලබා දීම (5)

20

$$(b) \quad w = \frac{-\sqrt{2}(3+i)}{(1+2i)} \times \frac{(1-2i)}{(1-2i)} \quad (5)$$

$$= \frac{-\sqrt{2}(3-6i+i+2)}{1+4}$$

$$= \frac{-\sqrt{2}}{5}(5-5i) \quad (5)$$

$$= -\sqrt{2} + \sqrt{2}i = 2 \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right). \quad (5) \quad (5)$$

$$\therefore |w| = 2 \text{ හා } \text{Arg } w = \frac{3\pi}{4}. \quad (5)$$


$(1-2i) \times$ ගුණක

ප්‍රධාන අංකය

මෙම ප්‍රකාශනයේ ප්‍රතිඵලය නිවැරදි බව පරීක්ෂා කරන්න.

25

2



$$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \quad (5)$$

$$= 1 + \sqrt{3}i \quad (5)$$

$$w = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

$$AB^2 = |z - w|^2 = (1 + \sqrt{2})^2 + (\sqrt{3} - \sqrt{2})^2 \quad (5)$$

$$= 1 + 2\sqrt{2} + 2 + 3 - 2\sqrt{6} + 2$$

$$= 8 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{6}. \quad (5)$$

25

$$\angle OCA = \frac{\pi}{2}, \angle AOC = \frac{1}{2} \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{5\pi}{24} \quad (5)$$

$$\sin^2 \frac{5\pi}{24} = \frac{AC^2}{OA^2} \quad (5)$$

$$= \frac{\left(\frac{AB}{2} \right)^2}{2^2} = \frac{1}{16} \cdot (8 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{6})$$

$$= \frac{1}{8} (4 + \sqrt{2} - \sqrt{6}). \quad (5)$$

15

$$(c) \quad (1 + \sqrt{3}i)^{3m} (1 + i)^8 = 2^{3m+4} \quad \text{----- (1)}$$

$$1 + \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \quad (5)$$

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \quad (5)$$

ද මූලාඩර් ප්‍රමේය භාවිතයෙන්,

$$(1) \Leftrightarrow 2^{3m} (\cos m\pi + i \sin m\pi) \cdot 2^4 (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 2^{3m+4} \quad (5) + (5)$$

$$\Leftrightarrow \cos m\pi + i \sin m\pi = 1$$

$$\Leftrightarrow \cos m\pi = 1$$


$$\Leftrightarrow m\pi = 2n\pi \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$m \text{ හි අඩුතම අගය} = 2 \quad (\because m \in \mathbb{Z}^+). \quad (5)$$

25

- 14.(a) $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ සඳහා, $f(x) = \frac{x^2 + x + p}{(x-1)^2}$ යැයි ගනිමු; මෙහි $p \in \mathbb{R}$ වේ. $y = f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරය, x -ඛණ්ඩාංක $-\frac{1}{3}$ වන ලක්ෂ්‍යයකදී, එහි තිරස් ස්පර්ශෝන්මුඛය ඡේදනය කරන බව දී ඇත. $p = 2$ බව පෙන්වන්න.
- $f(x)$ හි ව්‍යුත්පන්නය $f'(x)$ යන්න $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ සඳහා $f'(x) = -\frac{(3x+5)}{(x-1)^3}$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.
- එ නමුත්, $f(x)$ වැඩි වන ප්‍රාන්තර හා $f(x)$ අඩුවන ප්‍රාන්තර සොයන්න.
- $y = f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයෙහි හැරුම් ලක්ෂ්‍යයෙහි ඛණ්ඩාංක ද සොයන්න.
- $f(x)$ හි දෙවන ව්‍යුත්පන්නය $f''(x)$ යන්න $\mathbb{R} - \{1\}$ සඳහා $f''(x) = \frac{6(x+3)}{(x-1)^4}$ මගින් දෙනු ලබන බව ද, $y = f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයට $(-3, \frac{1}{2})$ හිදී තනිවර්තන ලක්ෂ්‍යයක් ඇති බව පෙන්වන්න.
- හැරුම් ලක්ෂ්‍යය, ස්පර්ශෝන්මුඛ හා තනිවර්තන ලක්ෂ්‍යය දක්වමින් $y = f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයේ දළ සටහන අඳින්න.

- (b) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, අරය 3 cm ක් වූ ගෝලයක සෘජු වෘත්තාකාර කේතුවක් අන්තර්ගත කළ යුතුව ඇත.
- කේතුවේ උස h cm යැයි ගනිමු. කේතුවේ පරිමාව V cm³ යන්න $V = \frac{\pi}{3}(6h^2 - h^3)$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.
- තවද, ගෝලය තුළ අන්තර්ගත කළ හැකි විශාලතම එබඳු කේතුව ලැබෙන්නේ $h = 4$ වන විට බව පෙන්වන්න.



(a) $f(x) = \frac{x^2 + x + p}{(x-1)^2}$; $x \neq 1$.

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$. (5)

$\therefore$ තිරස් ස්පර්ශෝන්මුඛය $y = 1$ වේ. (5)

$f\left(-\frac{1}{3}\right) = 1$ බව දී ඇත. (5)

එවිට $\frac{\frac{1}{9} - \frac{1}{3} + p}{\left(-\frac{4}{3}\right)^2} = 1$ (5)

$\therefore p - \frac{2}{9} = \frac{16}{9}$

$\therefore p = 2$. (5)

මෙම ලිපිය 10 වැනි පිටුවේ සිට 10 වැනි පිටුව දක්වා ව්‍යාප්ත වේ.

25

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{(x-1)^2}$$

$$\therefore f'(x) = \frac{(x-1)^2(2x+1) - (x^2+x+2)2(x-1)}{(x-1)^4} \quad (10) \quad / 0$$

$$= \frac{(x-1)(2x+1) - 2(x^2+x+2)}{(x-1)^3}$$

$$= \frac{2x^2 - x - 1 - 2x^2 - 2x - 4}{(x-1)^3}$$

$$= -\frac{(3x+5)}{(x-1)^3}; x \neq 1 \text{ සඳහා} \quad (5)$$

15

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{5}{3} \quad (5)$$

	$-\infty < x < -\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3} < x < 1$	$1 < x < \infty$
$f'(x)$ හි ලකුණ	(-)	(+)	(-)
$f(x)$	අඩු වේ.	වැඩි වේ.	අඩු වේ.

(10)

3 ම සඳහා
(5) ඔනෑම 2 ක් සඳහා

(10)

3 ම සඳහා
(5) ඔනෑම 2 ක් සඳහා

$f(x)$ යන්න $\left[-\infty, -\frac{5}{3}\right]$ මත හා $(1, \infty)$ මත අඩු වේ.

$f(x)$ යන්න $\left[-\frac{5}{3}, 1\right)$ මත වැඩි වේ.

25

$$f\left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{\left(-\frac{5}{3}\right)^2 - \frac{5}{3} + 2}{\left(-\frac{5}{3} - 1\right)^2} = \frac{\frac{25}{9} - \frac{5}{3} + 2}{\frac{64}{9}} = \frac{28}{64} = \frac{7}{16} \quad (5)$$

$$\text{හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයේ බන්ධාංක} = \left(-\frac{5}{3}, \frac{7}{16}\right) \quad (5)$$

15

$$f''(x) = \frac{6(x+3)}{(x-1)^4}; x \neq 1 \text{ සඳහා}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -3. \quad (5)$$

	$-\infty < x < -3$	$-3 < x < 1$
$f''(x)$ හි ලකුණ	(-)	(+)
අවකලනය	යටි අවතල	උඩු අවතල

$$(5) + (5)$$


$$(5) \text{ දෙකම සඳහා}$$

අවතලතාවය සහ
උඩු අවතලතාවය

$$f(-3) = \frac{9-3+2}{16} = \frac{1}{2}. \quad (5)$$

$\therefore y = f(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයට $\left(-3, \frac{1}{2}\right)$ හිදී නැතිවර්තන ලක්ෂ්‍යයක් ඇත.

(85)



(15)


(b) කේතුවේ පතුලේ අරය

$$= \sqrt{3^2 - (h-3)^2} \quad (5)$$

$$= \sqrt{6h - h^2}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi (6h - h^2) \times h$$

$$V = \frac{\pi}{3} (6h^2 - h^3); h > 0. \quad (5)$$



10


$$\frac{dV}{dh} = \frac{\pi}{3} (12h - 3h^2) = \pi(4 - h)h \quad (5)$$

$$\frac{dV}{dh} = 0 \Leftrightarrow h = 4 \quad (\because h > 0) \quad (5)$$

$$\frac{dV}{dh} > 0, 0 < h < 4 \text{ වීම}$$

$$\frac{dV}{dh} < 0, h > 4 \text{ වීම.}$$

$$\therefore V \text{ උපරිම වන්නේ } h = 4 \text{ වීමයි.} \quad (5)$$



20

15. (a) $k \in \mathbb{R}$ යැයි ගනිමු. $\int \frac{\sqrt{x}}{(1-k^2x)} dx$ සොයන්න.

(b) $0 < x < \frac{\pi}{4}$ සඳහා $\frac{d}{dx} \left\{ \ln \left(\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x} \right) \right\} = \frac{2}{\cos 2x}$ බව පෙන්වන්න.

කොටස් වශයෙන් අනුකලනය භාවිතයෙන්, $\int (\cos 2x) \ln \left(\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x} \right) dx$ සොයන්න.

(c) a නියතයක් වන $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ සූත්‍රය භාවිතයෙන්,

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos(x + \frac{\pi}{3})}{\sin x + \cos(x + \frac{\pi}{3})} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos(x + \frac{\pi}{3})} dx \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos(x + \frac{\pi}{3})}{\sin x + \cos(x + \frac{\pi}{3})} dx = \frac{\pi}{12} \text{ බව අපේක්ෂා කරන්න.}$$

(a) (i) අවස්ථාව : $k \neq 0$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{(1-k^2x)} dx$$

$$u = \sqrt{x} \text{ යැයි ගනිමු. } \textcircled{5}$$

$$= \int \frac{u}{(1-k^2u^2)} \cdot 2u du \textcircled{5}$$

$$\text{එවිට } \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \text{ හා } dx = 2\sqrt{x} du. \textcircled{5}$$

$$= 2 \int \frac{u^2}{(1-k^2u^2)} du$$

$$= \frac{2}{-k^2} \int \frac{1-k^2u^2-1}{(1-k^2u^2)} du \textcircled{5}$$

$$= \frac{-2}{k^2} \int \left\{ 1 - \frac{1}{(1-ku)(1+ku)} \right\} du \textcircled{5}$$

$$= \frac{-2}{k^2} \int \left\{ 1 - \frac{\frac{1}{2}}{1-ku} - \frac{\frac{1}{2}}{1+ku} \right\} du \textcircled{5} + \textcircled{5}$$

$$= \frac{-2}{k^2} \left\{ u + \frac{1}{2k} \ln|1-ku| - \frac{1}{2k} \ln|1+ku| \right\} + C; \text{ මෙහි } C \text{ යනු අභිමත නියතයකි. } \textcircled{5}$$

$$= \frac{-2}{k^2} \left\{ \sqrt{x} + \frac{1}{2k} \ln|1-k\sqrt{x}| - \frac{1}{2k} \ln|1+k\sqrt{x}| \right\} + C. \textcircled{5}$$

නිගමනය: $\int \frac{\sqrt{x}}{(1-k^2x)} dx = \frac{-2}{k^2} \left\{ \sqrt{x} + \frac{1}{2k} \ln|1-k\sqrt{x}| - \frac{1}{2k} \ln|1+k\sqrt{x}| \right\} + C$

(ii) අවස්ථාව: $k = 0$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1-k^2x} dx = \int \sqrt{x} dx \quad (5)$$

$$= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C_1; \text{ මෙහි } C_1 \text{ යනු අභිමත නියතයකි.} \quad (5)$$

65

$$(b) \quad \frac{d}{dx} \left\{ \ln \left(\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x} \right) \right\} = \frac{\cos 2x}{(1+\sin 2x)} \cdot \frac{\cos 2x(2 \cos 2x) + (1+\sin 2x)2 \sin 2x}{\cos^2 2x} \quad (10) \int$$

$$= \frac{2(\cos^2 2x + \sin 2x + \sin^2 2x)}{(1+\sin 2x) \cos 2x}$$

$$= \frac{2(1+\sin 2x)}{(1+\sin 2x) \cos 2x} \quad (5)$$

$$= \frac{2}{\cos 2x} \quad (5)$$

20

$$\int (\cos 2x) \ln \left(\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x} \right) dx$$

$$= \frac{\sin 2x}{2} \ln \left(\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x} \right) - \int \frac{\sin 2x}{2} \cdot \frac{2}{\cos 2x} dx \quad (10) / 6$$

$$= \frac{1}{2} \sin 2x \ln \left(\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x} \right) + \frac{1}{2} \ln |\cos 2x| + C; \text{ මෙහි } C \text{ යනු අභිමත නියතයකි.} \quad (10)$$

1 | නි C හි අගයය දෙක
හරයේ 2 දී අඩු කළා

20

$$(c) \int = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)}{\sin x + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{6} - x + \frac{\pi}{3}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6} - x + \frac{\pi}{3}\right)} dx \quad (10)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} dx \quad (5)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin x}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} + x\right) + \sin x} dx \quad (5)$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} dx \quad (5)$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)}{\sin x + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin x}{\sin x + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} dx \quad (10) / 0$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} 1 dx \quad (5)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot x \Big|_0^{\frac{\pi}{6}}$$

$$= \frac{\pi}{12} \quad (5)$$

16. O මූල ලක්ෂ්‍යය ද, $A \equiv (1, 2)$ හා $B \equiv \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{4}\right)$ යැයි ද ගනිමු. $\triangle OAB$ හා $\triangle OAB$ කෝණවල කෝණ සමවිෂේදකවල සමීකරණ සොයා, මෙම කෝණ සමවිෂේදක $D \equiv \left(\frac{5}{4}, \frac{5}{4}\right)$ ලක්ෂ්‍යයේදී ඡේදනය වන බව පෙන්වන්න.


D සිට OA රේඛාවට ලම්බ දුර සොයන්න.

OAB ත්‍රිකෝණයේ පාද තුනම ස්පර්ශ කරන C_1 වෘත්තයේ සමීකරණය ලියා දක්වන්න.

C_1 වෘත්තය, OA හා AB ස්පර්ශ කරන ලක්ෂ්‍ය පිළිවෙළින් E හා F යැයි සිතමු. A, E හා F ලක්ෂ්‍ය හරහා යන

C_2 වෘත්තයේ සමීකරණය $4x^2 + 4y^2 - 9x - 13y + 15 = 0$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.

C_1 හා C_2 වෘත්තයන්හි ඡේදනය ප්‍රලම්බ දැයි තීරණය කරන්න.



OA හි සමීකරණය : $y = 2x$ (5)

OB හි සමීකරණය : $2y = x$ (5).

$\triangle OAB$ හි කෝණ සමවිෂේදකය සඳහා

$$\frac{|y-2x|}{\sqrt{5}} = \frac{|2y-x|}{\sqrt{5}} \quad (10)$$

$\therefore y-2x = \pm(2y-x)$

$\therefore y-2x = 2y-x$ හෝ $y-2x = -(2y-x)$

$\therefore y+x=0$ හෝ $y-x=0$. (5) දෙකටම.

$(1, 2)$ ආදේශ කරන්න : $y+x=3 > 0$

$\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{4}\right)$ ආදේශ කරන්න : $y+x = \frac{15}{4} > 0$.

$\therefore \triangle OAB$ හි කෝණ සමවිෂේදකය $y-x=0$ වේ. (5)

AB හි සමීකරණය : $y-2 = \frac{\left(\frac{5}{4}-2\right)}{\left(\frac{5}{2}-1\right)}(x-1)$ (5)

$m = \frac{5/4 - 2}{5/2 - 1} = \frac{1}{2}$

|| $\frac{y-2}{x-1} = \frac{1}{2}$ බවට පත්වේ (5) වේ ද්‍රව්‍ය කරන්න
 tan θ = 5/12
 tan θ = 1/2
 5/12 = 1/2 (20)

$$y-2=-\frac{1}{2}(x-1)$$

$$2y+x-5=0 \quad (5)$$

$O\hat{A}B$ හි කෝණ සමවිච්ඡේදකය සඳහා

$$\frac{|2y+x-5|}{\sqrt{5}} = \frac{|y-2x|}{\sqrt{5}} \quad (10)$$

$$\therefore 2y+x-5=\pm(y-2x)$$

$$\therefore y+3x-5=0 \text{ හෝ } 3y-x-5=0. \quad (5)$$

$$(0,0) \text{ ආදේශ කරන්න : } y+3x-5=-5 < 0.$$

$$\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{4}\right) \text{ ආදේශ කරන්න : } y+3x-5 = \frac{5}{4} + \frac{15}{2} - 5 > 0.$$

$$\therefore O\hat{A}B \text{ කෝණයෙහි සමවිච්ඡේදකය } y+3x-5=0 \text{ වේ.} \quad (5)$$


$$D \text{ සඳහා } y-x=0 \text{ හා } y+3x-5=0:$$

$$\Rightarrow x=\frac{5}{4} \quad (5) \text{ හා } y=\frac{5}{4}. \quad (5)$$

$$\therefore D \equiv \left(\frac{5}{4}, \frac{5}{4}\right).$$

D සිට OA ට ලම්භ දුර

$$\frac{\left|\frac{5}{4} - 2 \cdot \frac{5}{4}\right|}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{4}. \quad (10)$$



$$C_1 \text{ හි සමීකරණය } \left(x-\frac{5}{4}\right)^2 + \left(y-\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{5}{16} \text{ වේ.} \quad (10)$$

$$\text{එනම් } x^2 + y^2 - \frac{5}{2}x - \frac{5}{2}y + \frac{45}{16} = 0.$$

EF යනු A සිට C_1 ට වූ ස්පර්ශ ජාය වේ.

$\therefore EF$ හි සමීකරණය $xx_1 + yy_1 + g(x+x_1) + f(y+y_1) + c = 0$ වේ.

$$\text{එනම් } x + 2y - \frac{5}{4}(x+1) - \frac{5}{4}(y+2) + \frac{45}{16} = 0. \quad (10)$$

$$16x + 32y - 20x - 20 - 20y - 40 + 45 = 0$$

$$-4x + 12y - 15 = 0.$$

$$4x - 12y + 15 = 0. \quad (5)$$

$\therefore C_2$ හි සමීකරණය

$$x^2 + y^2 - \frac{5}{2}x - \frac{5}{2}y + \frac{45}{16} + \lambda(4x - 12y + 15) = 0; \quad (10) \quad / \text{ or } 0$$

මෙහි λ නිර්ණය කළ යුතුය.

$A \equiv (1, 2)$ ලක්ෂ්‍යය C_2 මත වේ.

$$\therefore 1 + 4 - \frac{5}{2} - \frac{5}{2} + \frac{45}{16} + \lambda(4 - 24 + 15) = 0.$$

$$\frac{5}{16} - \lambda \times 5 = 0$$

$$\therefore \lambda = \frac{1}{16}. \quad (5)$$

C_2 හි සමීකරණය

$$x^2 + y^2 - \frac{5}{2}x - \frac{5}{2}y + \frac{45}{16} + \frac{4}{16}x - \frac{12}{16}y + \frac{15}{16} = 0.$$

$$16x^2 + 16y^2 - 40x - 40y + 45 + 4x - 12y + 15 = 0$$

$$16x^2 + 16y^2 - 36x - 52y + 60 = 0$$

$$4x^2 + 4y^2 - 9x - 13y + 15 = 0. \quad (10)$$

40

$E; F$ බන්ධන සමීකරණ $3x + 5y = 15$
 E, F, A ස්පර්ශ වන ස්පර්ශ ජාය
 සුළු කිරීම 19

$$E = \frac{3}{4}, \frac{3}{2}$$

$$F = \frac{3}{2}, \frac{7}{4}$$

$$C_1 \text{ සඳහා: } g = -\frac{5}{4}, f = -\frac{5}{4}, c = \frac{45}{16}$$

$$C_2 \text{ සඳහා: } g' = -\frac{9}{8}, f' = -\frac{13}{8}, c' = \frac{15}{4}$$

$$2gg' + 2ff' = 2\left(-\frac{5}{4}\right)\left(-\frac{9}{8}\right) + 2\left(-\frac{5}{4}\right)\left(-\frac{13}{8}\right) = \frac{45}{16} + \frac{65}{16} = \frac{55}{8}$$

(10)

$$c + c' = \frac{45}{16} + \frac{15}{4} = \frac{105}{16} \neq 2gg' + 2ff'. \quad (5)$$

(5)

∴ ප්‍රලම්භව ඡේදනය නොවේ.

20

17. (a) $\sin A, \sin B, \cos A$ හා $\cos B$ ඇසුරෙන් $\sin(A+B)$ ලියා දක්වන්න.

$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ බව අන්‍යෝන්‍ය කරන්න.

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ යැයි ගනිමු. $\cot \theta - 2 \tan \theta = \sin 2\theta$ සමීකරණය $a \cos^4 \theta + b \cos^2 \theta + c = 0$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න; මෙහි a, b හා c තාත්කල්පික නියත වේ.


එ නිසින්, $\theta = \cos^{-1} \sqrt{\frac{\sqrt{17}-1}{4}}$ බව පෙන්වන්න.

(b) කළයක් මත A, B, C හා D ප්‍රතින්ත ලක්ෂ්‍ය පිහිටා ඇත්තේ $\angle BAD = \angle ABC = \theta$ හා $3AD = 4BC$ වන පරිදි ය.

$\angle BAC = \alpha$ හා $\angle ABD = \beta$ යැයි ගනිමු. (රූපය බලන්න.)

සහිත් නීතිය භාවිතයෙන්, $\frac{BC}{AD} = \frac{\sin \alpha \sin(\theta + \beta)}{\sin \beta \sin(\theta + \alpha)}$ බව පෙන්වන්න.

$\cot \theta = 3 \cot \alpha - 4 \cot \beta$ බව අන්‍යෝන්‍ය කරන්න.



(c) සහන සමගාමී සමීකරණ, x හා y සඳහා විසඳන්න:

$$\sin^{-1} \sqrt{x} = \cos^{-1} \sqrt{y}$$

$$\tan(\tan^{-1} 3x - \tan^{-1} 2y) + \tan(\tan^{-1} 3y - \tan^{-1} 2x) = 1.$$

(a) $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ (5)

05

$$A = B = \theta.$$

$$\sin 2\theta = \sin \theta \cos \theta + \cos \theta \sin \theta$$

$$= 2 \sin \theta \cos \theta \quad (5)$$

05

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\cot \theta - 2 \tan \theta = \sin 2\theta$$

$$\Leftrightarrow \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - 2 \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 2 \sin \theta \cos \theta \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 \theta - 2 \sin^2 \theta = 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 \theta - 2(1 - \cos^2 \theta) = 2(1 - \cos^2 \theta) \cos^2 \theta \quad (10)$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos^4 \theta + \cos^2 \theta - 2 = 0. \quad (5)$$

$$a = 2, b = 1 \text{ and } c = -2.$$

25

$$\therefore \cos^2 \theta = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}, \text{ නමුත් } \cos^2 \theta > 0.$$

$$\therefore \cos^2 \theta = \frac{\sqrt{17}-1}{4} \quad (5) \quad \text{---} \quad \text{+} \quad \text{අනෙක } c$$


$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\sqrt{17}-1}{4}} \quad (\because \cos \theta > 0)$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \sqrt{\frac{\sqrt{17}-1}{4}}. \quad (5)$$

20

(b) $\triangle ABC$ සඳහා සයින නීතිය :

$$\begin{aligned} \frac{BC}{\sin \alpha} &= \frac{AB}{\sin(\pi - (\theta + \alpha))} \quad (10) / o \\ &= \frac{AB}{\sin(\theta + \alpha)} \quad \text{---} \quad (1) \quad (15) \end{aligned}$$



$\triangle ABD$ සඳහා සයින නීතිය :

$$\begin{aligned} \frac{AD}{\sin \beta} &= \frac{AB}{\sin(\pi - (\theta + \beta))} \quad (10) / b \\ &= \frac{AB}{\sin(\theta + \beta)} \quad \text{---} \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{(1)}{(2)} &\Rightarrow \frac{BC}{AD} \times \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = \frac{\sin(\theta + \beta)}{\sin(\theta + \alpha)} \\ &\Rightarrow \frac{BC}{AD} = \frac{\sin \alpha \sin(\theta + \beta)}{\sin \beta \sin(\theta + \alpha)} \quad (10) \end{aligned}$$

40

$$3AD = 4BC \Rightarrow \frac{BC}{AD} = \frac{3}{4}.$$

$$\therefore \frac{3}{4} = \frac{\sin \alpha \sin(\theta + \beta)}{\sin \beta \sin(\theta + \alpha)} \quad (5)$$

$$4 \sin \alpha (\sin \theta \cos \beta + \cos \theta \sin \beta) = 3 \sin \beta (\sin \theta \cos \alpha + \cos \theta \sin \alpha) \quad (10)$$

$$+ \sin \theta \sin \alpha \sin \beta : 4 \cot \beta + 4 \cot \theta = 3 \cot \alpha + 3 \cot \theta$$

$$\therefore \cot \theta = 3 \cot \alpha - 4 \cot \beta. \quad (5)$$

20

(c) $\sin^{-1} \sqrt{x} = \cos^{-1} \sqrt{y} = \alpha$ (say).

එවිට $\sin \alpha = \sqrt{x}$ සහ $\cos \alpha = \sqrt{y}$.

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. (5)

$\Rightarrow x + y = 1$. -----(1) (5)

$\therefore y = 1 - x$

$\tan(\tan^{-1} 3x - \tan^{-1} 2y) + \tan(\tan^{-1} 3y - \tan^{-1} 2x) = 1$

$\frac{3x-2y}{1+3x \times 2y} + \frac{3y-2x}{1+3y \times 2x} = 1$ (10) 0

(1) $\Rightarrow$

$3x - 2(1-x) + 3(1-x) - 2x = 1 + 6x(1-x)$ (5)

$3x - 2 + 2x + 3 - 3x - 2x = 1 + 6x - 6x^2$

$6x(1-x) = 0$

$x = 0$ හෝ $x = 1$. (5)

$x=0$ විට $y=1$ වුවහොත් $x=1$ විට $y=0$ වේ. ($\because$ (1))

$\left. \begin{matrix} x=0 \\ y=1 \end{matrix} \right\}$ හෝ $\left. \begin{matrix} x=1 \\ y=0 \end{matrix} \right\}$. (5)

යුගල දෙකම සම්කරණ දෙකම තෘප්ත කරයි.

35

අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය - 2025

10 - සංයුක්ත ගණිතය II

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

II පත්‍රය

$$A \text{ කොටස} = 10 \times 25 = 250$$


$$B \text{ කොටස} = 05 \times 150 = 750$$

$$\text{එකතුව} = \frac{1000}{10}$$

$$\text{අවසන් ලකුණ} = 100$$

A කොටස

1. ස්කන්ධය m වූ A අංශුවක් ප්‍රමිත තිරස් මේසයක් මත නිශ්චලව ඇත. u වේගයකින් මේසය මත චලනය වන ස්කන්ධය $2m$ වූ B අංශුවක් A සමඟ සරල ලෙස ගැටේ. A හා B අතර ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය e වේ. ගැටුමට පසු A අංශුවෙහි වේගය $\frac{2}{3}(1+e)u$ බව පෙන්වන්න.
- ගැටුමෙහිදී B මගින් A මත යොදන ආවේගයෙහි විශාලත්වය mu බව දී ඇත. $e = \frac{1}{2}$ බව පෙන්වන්න.



පද්ධතිය සඳහා $I = \Delta(mV) \rightarrow$

$$0 = mv_1 + 2mv_2 - 2mu \quad (5)$$

ආ: ප්‍ර: ති

$$\therefore v_1 + 2v_2 = 2u \quad \text{----- (1)}$$

නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති නියමයෙන් :

$$v_1 - v_2 = eu \quad \text{----- (2)}$$

$$(1) \text{ හා } (2) \Rightarrow 3v_1 = 2u + 2eu$$

$$\therefore v_1 = \frac{2}{3}(1+e)u. \quad (5)$$

A සඳහා, $I = \Delta(mV) \rightarrow$


$$I = mv_1 \quad (5)$$

$$\therefore mu = m \cdot \frac{2}{3}(1+e)u \quad (5)$$

$$3 = 2 + 2e$$

$$\therefore e = \frac{1}{2} \quad (5)$$

2. u ආරම්භක වේගයක් ඇතිව නිරස සමග θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) කෝණයකින්, නිරස් ගෙඩිමස් මත වූ O ලක්ෂ්‍යයකින් ආශ්‍රවත් ප්‍රක්ෂේප කරනු ලැබේ. අංශුව ගුරුත්වය යටතේ චලනය වේ. ප්‍රක්ෂිප්තයෙහි නිරස් පරාසය සොයා, එය $\frac{\sqrt{3}u^2}{2g}$ නම්, $\theta = \frac{\pi}{6}$ හෝ $\theta = \frac{\pi}{3}$ බව පෙන්වන්න.



$$\sqrt{3} \tan^2 \theta - 4 \tan \theta + \sqrt{3} = 0$$

$$(\sqrt{3} \tan \theta - 1)(\tan \theta - \sqrt{3}) = 0$$

R යනු නිරස් පරාසය යැයි ගනිමු.

$$O \text{ සිට } A \text{ දක්වා, } s = ut + \frac{1}{2}at^2 \rightarrow$$

$$R = u \cos \theta \cdot T. \text{ ----- (1) } \quad (5)$$

$$\uparrow 0 = u \sin \theta \cdot T - \frac{1}{2}gT^2 \quad (5)$$

$$\Rightarrow T = \frac{2u \sin \theta}{g}.$$

$$(1) \Rightarrow R = u \cos \theta \cdot \frac{2u \sin \theta}{g} \quad (5)$$

$$= \frac{2u^2}{g} \sin \theta \cos \theta.$$

$$R = \frac{\sqrt{3}u^2}{2g} \text{ යැයි ගනිමු. එවිට } \frac{\sqrt{3}u^2}{2g} = \frac{2u^2}{g} \sin \theta \cos \theta$$



$$\therefore \sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad (5)$$

$$\therefore \sin 2\theta = \sin \frac{\pi}{3}$$

$$2\theta = \frac{\pi}{3} \text{ හෝ } \frac{2\pi}{3} \quad \left(\because 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{6} \text{ හෝ } \theta = \frac{\pi}{3}. \quad (5)$$

3. ස්කන්ධ පිළිවෙළින් $4m$ හා m වන P හා Q අංශු දෙකක් සැහැල්ලු අවිකතා තන්තුවකින් යා කර ඇත. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, තන්තුව, එක එකක් තිරසර $\frac{\pi}{4}$ කෝණයකින් ආනත වූ අවල තල දෙකක මුදුනෙහි සවි කර ඇති A සුමට කුඩා කප්පියක් මගින් යයි. P අංශුව තමා ඇති තලය සුමට වන අතර, Q අංශුව තමා ඇති තලය රළු වේ. Q හා රළු තලය අතර සර්ෂණ සංගුණකය $\frac{1}{2}$ වේ. තන්තුව තදව ඇතිව හා තන්තුවේ AP හා AQ කොටස් අනුරූප කලවල C සර්ම බැවුම් රේඛා දිගේ තිබෙමින් අංශු අල්වා තබා, නිශ්චලතාවයේ සිට මුදාහරිනු ලැබේ. P , තලයේ පහළට චලනය වන බව දී ඇත. තන්තුවේ ආතතිය නිර්ණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලබාගන්න.



බල හා (5)
ත්වරණ සඳහා
ච්ඡර්තා දෙන
නවතා විස්තූතය

$$F = \frac{1}{2} S \quad (5)$$

$$\underline{F = ma}:$$

$$(P) \quad \checkmark \quad 4mg \sin \frac{\pi}{4} - T = 4mf \quad (5)$$

$$(Q) \quad \checkmark \quad T - F - mg \sin \frac{\pi}{4} = mf \quad (5)$$


$$(Q) \quad \checkmark \quad S - mg \cos \frac{\pi}{4} = 0 \quad (5)$$

ච්ඡර්තා F_1 හා F_2 ලෙස ලියා
ඇත්වීම

පිටු (20) දෙකම

4. ස්කන්ධය 1250 kg වූ මෝටර් රථයක් 1000 N නියත ප්‍රතිරෝධයකට එරෙහිව සෘජු තිරස් මාර්ගයක් මත 32 m s^{-1} නියත වේගයකින් චලනය වෙමින් ඇත. මෝටර් රථයෙහි එන්ජිම මගින් ජනනය කරනු ලබන ජවය 32 kW බව පෙන්වන්න.

දැන්, මෝටර් රථය, තිරස්ව $\sin^{-1}\left(\frac{1}{5}\right)$ ක කෝණයකින් ආනත සෘජු මාර්ගයක් දිගේ පහළට එම නියත ප්‍රතිරෝධයටම එරෙහිව චලනය වේ. එහි ක්වරණය 4 m s^{-2} වන හා එහි එන්ජිම 20 kW ජවයකින් ක්‍රියාකරන මොහොතකදී මෝටර් රථයේ වේගය තීරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලබාගන්න.



$$F = ma \rightarrow$$

$$F - 1000 = 0$$

(5)


$$\therefore F = 1000$$

$$\text{ජවය} : P = F \times 32$$

$$= 32 \times 1000 \text{ W}$$

$$= 32 \text{ kW.}$$

(5)



$$\sin \theta = \frac{1}{5}$$

$$\text{නව } P = 20 \text{ kW}$$

$$= 20 \times 1000 \text{ W}$$

$$20 \times 1000 = F_1 \times v$$

(5)



$$F = ma \checkmark F_1 - 1000 + 1250g \sin \theta = 1250 \times 4$$

(10)

07 0

$$F_1 = 3500 \text{ N}$$

5. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, අරය $2a$ වූ කුහි අර්ධගෝලාකාර කබොලක් එහි වාත්තාකාර ගැටිය නිරස්ව ඇතිව සවි කර ඇත. ස්කන්ධය m වූ P අංශුවකට u වේගයක් දෙනු ලබන්නේ කබොලෙහි ඇතුළත සුම්ඵ පාෂාණය මත, කබොලෙහි වාත්තාකාර ගැටියේ කේන්ද්‍රයට a දුරක් පහළින් කේන්ද්‍රය පිහිටි නිරස් වාත්තයක චලනය වන පරිදි ය. $u = \sqrt{3ga}$ බව පෙන්වන්න.



බල හා $\theta = \frac{\pi}{6}$ (5)
 දෙනවා ව

$$F = ma \uparrow, R \sin \frac{\pi}{6} - mg = 0 \quad (5)$$

$$\therefore R = 2mg. \quad (5)$$

$$\rightarrow R \cos \frac{\pi}{6} = m \frac{u^2}{\sqrt{3}a} \quad (5)$$

$$2mg \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{mu^2}{\sqrt{3}a}$$

$$u^2 = 3ga$$

$$\therefore u = \sqrt{3ga}. \quad (5)$$

6. $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} - \{0\}$ යැයි ගනිමු. සුදුසු අංකනයෙන්, $\underline{a} = \alpha\mathbf{i} + \beta\mathbf{j}$ හා $\underline{b} = \gamma\mathbf{i} - \beta\mathbf{j}$ යනු $|\underline{a}|^2 + |\underline{b}|^2 = 1$ සපුරාලන පරිදි දූ දෛශික දෙකක් යැයි ගනිමු. $\alpha^2 + 2\beta^2 + \gamma^2 = 1$ බව පෙන්වන්න.
 $\underline{a}$ හා $\underline{b}$ දෛශික එකිනෙකට ලම්භ බව දී ඇත. $\beta^2 = \alpha\gamma$ බව පෙන්වන්න.
 $\alpha = \frac{1}{3}$ නම් γ හි අගය සොයන්න.

$$\left. \begin{aligned} |\underline{a}|^2 &= \alpha^2 + \beta^2 \\ |\underline{b}|^2 &= \gamma^2 + (-\beta)^2 = \gamma^2 + \beta^2 \end{aligned} \right\} \textcircled{5}$$

$$|\underline{a}|^2 + |\underline{b}|^2 = 1$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \beta^2 = 1$$

$$\therefore \alpha^2 + 2\beta^2 + \gamma^2 = 1. \text{-----} (1) \textcircled{5}$$

$$\underline{a} \perp \underline{b} \Rightarrow \underline{a} \cdot \underline{b} = 0$$

$$\Rightarrow \alpha\gamma - \beta^2 = 0 \textcircled{5}$$

$$\therefore \beta^2 = \alpha\gamma$$

$$\alpha = \frac{1}{3} \text{ යැයි ගනිමු. එවිට } \beta^2 = \frac{\gamma}{3} \Rightarrow \gamma > 0$$

$$(1) \Rightarrow \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{\gamma}{3} + \gamma^2 = 1 \textcircled{5}$$

$$9\gamma^2 + 6\gamma - 8 = 0$$


$$(3\gamma - 2)(3\gamma + 4) = 0$$

$$\gamma = \frac{2}{3} \text{ or } \gamma = -\frac{4}{3}$$

$$\therefore \gamma = \frac{2}{3} \textcircled{5}$$

8. බර W වූ P අංශුවක්, කේන්ද්‍රය O , අරය a හා බර W වූ ඒකාකාර වෘත්තාකාර කුඩා කැටිකින කැටියට සවි කර ඇත. ඊළු සිරස් බිත්තියකට එරෙහිව ඊළු නිරස් බෙහිමක් මත කැටිය සම්බලිතව ඇත. කැටිය හා බෙහිම අතර ස්පර්ශක සංගුණකය μ වන අතර කැටිය හා බිත්තිය අතර ද එය μ ම වේ. OP සිරස සමඟ θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) කෝණයක් සාදන විට කැටිය සීමාකාරී සම්බලිතතාවයේ ඇති බව දී ඇත. කැටිය මත ක්‍රියාකරන බල රූපයේ ලකුණු කර ඇත.

$$\cos \theta = \frac{2\mu(\mu+1)}{\mu^2+1} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$



$$\rightarrow R_2 = \mu R_1 \text{ ----- (1) } \textcircled{5}$$

$$\uparrow R_1 + \mu R_2 = 2W \text{ } \textcircled{5}$$

$$\therefore R_1 + \mu \cdot \mu R_1 = 2W$$

$$\therefore R_1 = \frac{2W}{(1+\mu^2)} \text{ ----- (2) } \textcircled{5}$$

$$\curvearrowleft O \text{) } \mu R_1 \cdot a + \mu R_2 \cdot a - W \cdot a \cos \theta = 0 \text{ } \textcircled{5}$$

$$\cos \theta = \frac{\mu(R_1 + R_2)}{W}$$

$$= \frac{\mu(1+\mu)R_1}{W} \text{ ((1)න්)}$$

$$= \frac{2\mu(1+\mu)}{(1+\mu^2)} \text{ ((2)න්) } \textcircled{5}$$

9. A, B හා C යනු, A හා B ප්‍රධානත්වය ඇති, B හා C අන්තර්ගතය වශයෙන් සම්බන්ධයෙන්, $P(B) = \frac{1}{5}$ ද $P(A \cup B) = P(B \cup C)$ ද වන පරිදි, Ω නියැදි අවකාශයක දී පිළිබිඹු කළ හැකි නිසි $P(C) = \frac{4}{5}P(A)$ බව පෙන්වන්න.
 $P(C|A) = 2P(A \cap C) \neq 0$ නම් $P(C)$ සොයන්න.

$$P(A \cup B) = P(B \cup C)$$

$$\Rightarrow P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(B) + P(C) \quad (5)$$

$$\Rightarrow P(A) - P(A \cap B) = P(C)$$

$$\Rightarrow P(C) = \frac{4}{5}P(A) \quad (5) \quad \left(\because P(B) = \frac{1}{5} \right)$$

$$P(C|A) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} = 2P(A \cap C)$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{1}{2} \quad (\because P(A \cap C) \neq 0)$$

$$\therefore P(C) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{5} \quad (5) \quad \left(\because P(C) = \frac{4}{5}P(A) \right)$$

10. ඇරෝහණ පිළිවෙළට සකස් කරන ලද $1, p, 4, 10, q$ නිරීක්ෂණ පහත මධ්‍යන්‍යය 6 වේ; මෙහි p හා q යනු තාත්කලීන සංඛ්‍යා වේ. මෙම නිරීක්ෂණ, $y = 3x + c$ පරිණාමනය මගින් පරිණාමනය කර ඇත; මෙහි x මගින් මූල් නිරීක්ෂණ දක්වන අතර c යනු තාත්කලීන සංඛ්‍යාවකි. පරිණාමිත නිරීක්ෂණවල මධ්‍යන්‍යය හා පරාසය පිළිවෙළින් 20 හා 33 වේ. p, q හා c හි අගයන් සොයන්න.

$$\frac{1+4+p+10+q}{5} = 6 \quad (5)$$

$$\Rightarrow p+q=15$$

$$3 \times 6 + c = 20 \quad (5)$$

$$\therefore c = 2.$$

$$\text{පරිණාමිත නිරීක්ෂණවල පරාසය} = (3q+c) - (3+c)$$

$$\therefore 3q-3=33 \quad (5)$$

$$\therefore q=12$$

$$\therefore p=3.$$


$$p, q \text{ හා } c \text{ හි අගයන් සඳහා} \quad (10)$$

$$\text{ඕනෑම දෙකක්} \quad (5)$$


B කොටස

11. (a) නියත $f \text{ m s}^{-2}$ චන්ද්‍රණයකින් සරල රේඛාවක් දිගේ ගමන් කරන P අංශුවක්, කාලය $t = 0 \text{ s}$ හිදී 60 m s^{-1} ක ප්‍රවේගයකින් O ලක්ෂ්‍යයෙන් පසු කරයි; මෙහි $f > 0$ වේ. P අංශුව නිශ්චලතාවයට පැමිණි විනාඩි එකකි. එය O දෙසට $f \text{ m s}^{-2}$ නියත චන්ද්‍රණයකින් චලනය වේ. O හි නිශ්චලතාවයේ පැවති තවත් Q අංශුවක්, කාලය $t = \frac{30}{f} \text{ s}$ හිදී $f \text{ m s}^{-2}$ නියත චන්ද්‍රණයකින් එම සරල රේඛාව දිගේම P දෙසට චලනය ආරම්භ කර, 30 m s^{-1} ප්‍රවේගයක් ලබාගත් පසු එම නියත ප්‍රවේගයම පවත්වා ගෙන යයි. Q අංශුව නියත ප්‍රවේගයට පැමිණි තත්පර 10 කට පසු Q අංශුව P අංශුව හමුවේ. එකම රූපයකින්, $t = 0 \text{ s}$ සිට P හා Q හමුවන තෙක්, ඒවායේ චලිත සඳහා ප්‍රවේග-කාල ප්‍රස්ථාරවල දළ සටහන් අඳින්න.
- $f = 3$ බවත් O සිට අංශු හමුවන ලක්ෂ්‍යයට දුර 450 m බවත් පෙන්වන්න.


- (b) සමාන්තර සෘජු ඉවුරු සහිත පළල a වූ ගමන් u ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් ගලයි. රූපයෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි, A , B හා C ලක්ෂ්‍ය ඉවුරු මත පිහිටා ඇත්තේ AB ඉවුරුවලට ලම්භක හා $BC = 2a$ වන පරිදි ය. P හා Q බෝට්ටු දෙකක් පිළිවෙළින් A හා B හිදී එකම වේගයකින් නම් ගමන් ආරම්භ කරයි. P බෝට්ටුව ජලයට සාපේක්ෂව $2\sqrt{5}u$ ප්‍රවේගයකින් $\vec{AC}$ දිශාවට ගමන් කරයි. Q බෝට්ටුව ජලයට සාපේක්ෂව $\sqrt{2}u$ වේගයකින් පොළොවට සාපේක්ෂව $\vec{BA}$ දිශාවට ගමන් කරයි. එකම රූපයක, P හි හා Q හි චලිත සඳහා ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණවල දළ සටහන් අඳින්න.
- පොළොවට සාපේක්ෂව P හි ප්‍රවේගයත් පොළොවට සාපේක්ෂව Q හි වේගයත් සොයන්න.
- තවද, Q ට සාපේක්ෂව P හි ප්‍රවේගයේ දිශාවක් ඒ සඳහා, P හා Q අතර කෙටිම දුරක් සොයන්න.



(a)



P සහ Q හමුවන ලක්ෂ්‍යය B යැයි ගනිමු.



20

P හි වලිකය සැලකීමෙන්,

$OB = \Delta OCD$ හි වර්ගඵලය - ΔDIE හි වර්ගඵලය

$$= \frac{1}{2} \times \frac{60}{f} \times 60 - \frac{1}{2} \times 10 \times 10f \quad (5) \text{ ලද ප්‍රතිචාරයකට}$$

$$= \frac{1800}{f} - 50f \quad \text{----- (1)}$$

Q හි වලිකය සැලකීමෙන්,

$OB = \Delta DFG$ හි වර්ගඵලය + $DGHI$ හි වර්ගඵලය

$$= \frac{1}{2} \times \frac{30}{f} \times 30 + 30 \times 10 \quad (5) \text{ ලද ප්‍රතිචාරයකට}$$

$$= \frac{450}{f} + 300 \quad \text{----- (2)}$$

$$(1) \text{ හා } (2) \Rightarrow \frac{1800}{f} - 50f = \frac{450}{f} + 300 \quad (10) \text{ රහස්‍ය ලේඛනයකි.}$$

$$\frac{1350}{f} = 50f + 300$$

$$50f^2 + 300f - 1350 = 0 \quad (5)$$

$$f^2 + 6f - 27 = 0$$

$$(f-3)(f+9) = 0 \quad (5)$$

$$f = 3. \quad (5) \quad (\because f > 0)$$


45

$$\begin{aligned}\therefore OB &= \frac{450}{3} + 300 \\ &= 450m\end{aligned}$$

10

10

(b)



$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\tan \theta = 2$$

$$V(P, W) = \frac{2}{\sqrt{5}}u \quad (5)$$

$$V(W, E) = u \rightarrow (5)$$

$$V(Q, W) = \sqrt{2}u \quad (5)$$

$$V(Q, E) = \uparrow (5)$$

$$V(P, E) = V(P, W) + V(W, E)$$

$$= \vec{XY} + \vec{YZ}$$

$$= \vec{XZ}$$


$$V(Q, E) = V(Q, W) + V(W, E)$$

$$= \vec{UY} + \vec{YZ}$$

$$= \vec{UZ}$$

වෙන වෙනම
සැලකීමක් කළොත්

$$\frac{15}{20}$$



එකම
අවස්ථාවක

45

$$XV = 2\sqrt{5}u \cos \theta = 2u$$

$$YV = 2\sqrt{5}u \sin \theta = 4u$$

$$V(P, E) = \vec{XZ}$$

$$= \sqrt{2^2 + 3^2}u$$

$$= \sqrt{13}u$$

$$\tan \beta = \frac{3}{2}$$



10



5

$$\text{පෘථිවියට සාපේක්ෂව Q හි වේගය} = UZ = u$$

5

20

$$V(P, Q) = V(P, E) + V(E, Q)$$


$$= \begin{matrix} \leftarrow 3u \\ \downarrow 2u \end{matrix} + \begin{matrix} \downarrow u \end{matrix} = \begin{matrix} \leftarrow 3u \\ \swarrow \frac{\pi}{4} \\ \downarrow 3u \end{matrix}$$

$$\therefore P \text{ හා } Q \text{ අතර කෙටිම දුර } a \sin \frac{\pi}{4} = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$


10

10

12. (a) ජ්‍යාමිතිය $10m$ වූ සුමට ඒකාකාර කුට්ටියක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තුළින් වූ $ABCDE$ හි රේඛා රූපයේ දැක්වේ. AE අඩංගු භ්‍රූණාකාර සුමට හිරස් කෙරෙහි තබා ඇත. තවද, AB, BC හා DE ඒවා අඩංගු භ්‍රූණාකාරවල උපරිම බිඳුම් පෙරා වන අතර, CD, AE ට සමාන්තර ද $\angle EAB = \angle ABC = \angle DEA = \frac{\pi}{3}$ ද වේ. ජ්‍යාමිතිය පිළිවෙලින් $5m, m$ හා m වන P, Q හා R අංශු තුනක්, පිළිවෙලින් AB, BC හා DE මත අල්ලා තබා ඇත. B හිදී කුට්ටියට සවි කර ඇති සුමට සැහැල්ලු කුටා කප්පියක් මගින් යන සැහැල්ලු අවිනාශ හත්කුරක දෙකෙළවරට P හා Q අංශු ඇදා ඇත. රූපයේ දක්වා ඇති පිහිටුමේ සිට තත්ත්වය තදව ඇතිව, පද්ධතිය නිශ්චලතාවයෙන් මුදා හැරේ. කුට්ටියෙහි නිවරණයන්, කුට්ටිය මගින් P මත ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වයන් නිර්ණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් සම්කරණ ලබාගන්න.




(b) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, අරය a ද, කේන්ද්‍රය O ද හා $\angle AOB = \frac{2\pi}{3}$ ද වූ වෘත්තාකාර වායයක හැඩැති AB සුමට කුහි දාඨ කම්බියක්, OA සිරස්ව ඇතිව සිරස් තලයක සවි කර ඇත. ජ්‍යාමිතිය m වූ සුමට කුටා පබදුවක් A හි තබා $\sqrt{\frac{7ga}{2}}$ වේගයකින් කම්බිය දිගේ ප්‍රක්ෂේපනය කරනු ලැබේ. පබදුව O වටා θ ($0 < \theta \leq \frac{2\pi}{3}$) කෝණයකින් හැරී ඇති විට එහි ව වේගය $v^2 = \frac{ga}{2}(3 + 4 \cos \theta)$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.



තවද, කම්බිය හැර ගිය පසු, පබදුව නැවත A වෙත පැමිණෙන බව පෙන්වා, පබදුව A කරා ළඟා වන විට එහි වේගය සොයන්න.

(a)



$$a(E, \text{කුට්ටිය}) \Rightarrow F$$

$$a(R, \text{කුට්ටිය}) = f_2$$

බල සඳහා :

$$a(P, \text{කුට්ටිය}) = f_1$$

$$a(Q, \text{කුට්ටිය}) = f_1 \quad \text{5}$$

$$P \text{ මත } 5$$

$$Q \text{ මත } 5$$

$$\text{කුට්ටිය මත } 10 \quad 5$$

$$R \text{ මත } 5$$

$F = ma$ යොදවමු :

$$0 = 10mF + 5m\left(F - \frac{f_1}{2}\right) + m\left(F - \frac{f_1}{2}\right) + m\left(F + \frac{f_2}{2}\right)$$

$$P \swarrow 5mg \times \frac{\sqrt{3}}{2} - T = 5m\left(f_1 - \frac{F}{2}\right)$$


$$Q \swarrow T - mg \times \frac{\sqrt{3}}{2} = m\left(f_1 - \frac{F}{2}\right)$$

$$R \swarrow mg \frac{\sqrt{3}}{2} = m\left(f_2 + \frac{F}{2}\right)$$

$$P \swarrow S - 5mg \times \frac{1}{2} = 5m\left(-F \times \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

85

(b)



ශක්ති සංස්ථිතියෙන් :

$$\frac{1}{2}mV^2 + mg(a - a \cos \theta) = \frac{1}{2}m \times \frac{7ga}{2}$$

$$V^2 = -2ga(1 - \cos \theta) + \frac{7ga}{2}$$

$$= \frac{ga}{2}(3 + 4 \cos \theta)$$

P.E.

5

K.E.

5

සම්කරණය

5

20

$$\theta = \frac{2\pi}{3} \text{ වන විට, } V^2 = \frac{ga}{2} \left(3 + 4 \left(-\frac{1}{2} \right) \right)$$

$$= \frac{ga}{2}$$

B සිට OA හමුවන ලක්ෂ්‍යය දක්වා ගුරුත්වය යටතේ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$:

$$\leftarrow \frac{a\sqrt{3}}{2} = \sqrt{\frac{ga}{2}} \times \frac{1}{2}T. \quad (5)$$

$$\therefore T = \sqrt{\frac{6a}{g}} \quad (5)$$

$$\downarrow h = -\sqrt{\frac{ga}{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2}T + \frac{1}{2}gT^2 \quad (10)$$

$$= -\sqrt{\frac{ga}{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{\frac{6a}{g}} + \frac{1}{2}g \times \frac{6a}{g} \quad (5)$$

$$= -\frac{3a}{2} + 3a = \frac{3a}{2}. \quad (5)$$

$\therefore$ පබලුව ආපසු A වෙත පැමිණෙයි.

35

කෙත් සංස්ථිතිය $\Rightarrow$ ආපසු A වෙත පැමිණෙන විට පබලුවේ වේගය $= \sqrt{\frac{7ga}{2}}. \quad (10) \quad 0.8 \quad 0$

10

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$s = 0 + \frac{1}{2}g \cos 30^\circ t^2$$

$$2s = g \frac{\sqrt{3}}{2} t^2$$

$$\frac{4s}{\sqrt{3}g} = t^2$$

$$\frac{4s}{\sqrt{3}g} = \frac{2a}{g}$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$0 = \sqrt{\frac{ga}{2}} t - \frac{1}{2}g t^2$$

$$\frac{1}{2}g t^2 = \sqrt{\frac{ga}{2}} t$$

$$\frac{1}{2}t^2 g = \frac{ga}{\sqrt{2}}$$

$$t^2 = \frac{2a}{g}$$

$$s = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

13. $AB = 16a$ වන පරිදි, A හා B අවල ලක්ෂ්‍ය දෙකක් යුගල නිරස් මේසයක් මත පිහිටා ඇත. ස්වභාවික දිග $2a$ හා ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය $3mg$ වන S_1 සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක එක් කෙළවරක් ස්කන්ධය m වූ P අංශුවකට ඇඳා ඇති අතර S_1 හි අනෙක් කෙළවර A ට ඇඳා ඇත. තවද, ස්වභාවික දිග $4a$ හා ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය $4mg$ වන දෙවන S_2 සැහැල්ලු ප්‍රත්‍යාස්ථ තන්තුවක එක් කෙළවරක් P ට ඇඳා ඇති අතර S_2 හි අනෙක් කෙළවර B ට ඇඳා ඇත. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, C ලක්ෂ්‍යයකදී P අංශුව සමතුලිතතාවේ පවතී.




AC හි දිග හා BC හි දිග සොයන්න.

දැන්, P අංශුව B දෙසට $2a$ දුරක් ඇද, නිශ්චලතාවේ සිට මුදාහරිනු ලැබේ. P හි චලිත සමීකරණය $\ddot{x} + \omega^2(x - 6a) = 0$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න; මෙහි $AP = x$ වන අතර $\omega (> 0)$ නිර්ණය කළ යුතු නියතයක් වේ.

$X = x - 6a$ ලෙස ගෙන, $\ddot{X} + \omega^2 X = 0$ බව පෙන්වා මෙම සරල අනුවර්ති චලිතයේ ආවර්ත කාලය ප්‍රකාශ කරන්න.

$\dot{X}^2 = \omega^2(c^2 - X^2)$ සූත්‍රය භාවිතයෙන්, මෙම චලිතයේ විස්තාරය c ද, P හි උපරිම වේගය ද සොයන්න.


මෙම චලිතයේදී P , C ට ළඟා වන තෙමු මොහොතේදී, S_2 තන්තුව කපනු ලැබේ.



රූපයේ දැක්වෙන පරිදි, D යනු $AD = 2a$ වන පරිදි වූ AC මත වූ ලක්ෂ්‍යය යැයි ගනිමු. C සිට D දක්වා P හි චලිත සමීකරණය $\ddot{y} + \omega_1^2 y = 0$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න; මෙහි $DP = y$ වන අතර $\omega_1 (> 0)$ නිර්ණය කළ යුතු නියතයක් වේ.

මෙම සරල අනුවර්ති චලිතයේ විස්තාරය $\sqrt{\frac{68}{3}}a$ බව පෙන්වන්න.

P චලිතයේ යෙදවූ මොහොතේ සිට එය A ලක්ෂ්‍යය කරා ළඟා වන තෙක් ගත වූ මුළු කාලය සොයන්න.



$$T_1 = T_2$$

$$\frac{z}{2a} \times 3mg = \frac{(10a - z)}{4a} \times 4mg \quad (10)$$

$$3z = 20a - 2z$$


$$\therefore z = 4a \quad (5)$$

$$\therefore AC = 6a \text{ හා } BC = 10a.$$

$$(5)$$

$$(5)$$

25



$$P \circ \underline{F} = m \underline{a} \rightarrow$$

$$m\ddot{x} = \frac{(16a-x-4a)}{4a} \times 4mg - \frac{(x-2a)}{2a} \times 3mg \quad (5)$$

$$\ddot{x} = (12a-x) \frac{g}{a} - (x-2a) \frac{3g}{2a}$$

$$= \frac{g}{2a} \{24a - 2x - 3x + 6a\}$$

$$= \frac{g}{2a} \{30a - 5x\}$$

$$= -\frac{5g}{2a} (x-6a) \quad (10)$$

$$\therefore \ddot{x} + \omega^2 (x-6a) = 0; \text{ මෙහි } \omega = \sqrt{\frac{5g}{2a}} \quad (5)$$

30

$$X = x - 6a \Rightarrow \dot{X} = \dot{x} \text{ හා } \ddot{X} = \ddot{x}$$

$$\therefore \ddot{X} + \omega^2 X = 0. \quad (5) \quad (5)$$

$$\text{ආවර්ථ කාලය} = \frac{2\pi}{\omega} \quad (5) \quad \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{5g}{2a}}} = \sqrt{\frac{6a}{5g}} \pi$$

15

$$\dot{X}^2 = \omega^2 (c^2 - X^2) \dots\dots\dots (1)$$

$$x = 8a \text{ වට } \dot{x} = 0 \text{ වේ.}$$

$$\text{එනම්, } X = 2a \text{ වට } \dot{X} = 0 \text{ වේ.} \quad (5)$$


$$\text{ඇත්, (1)} \Rightarrow c = 2a. \quad (5)$$

$$\text{උපරිම } \dot{X}^2 = \omega^2 c^2$$

$$\therefore \text{උපරිම } \dot{X} = \omega c = \sqrt{\frac{5g}{2a}} \times 2a = \sqrt{10ga}.$$

10

20



$$F = ma \rightarrow m\ddot{y} = -\frac{y}{2a} \cdot 3mg \quad (5)$$

$$\therefore \ddot{y} = -\frac{3g}{2a} y.$$

$$\therefore \ddot{y} + \omega^2 y = 0; \text{ මෙහි } \omega = \sqrt{\frac{3g}{2a}}. \quad (5)$$

10

$$y^2 = c_1^2 - y^2$$

$$y = 4a \text{ විට } \dot{y} = \sqrt{10ag} \text{ වේ.} \quad (5)$$

$$\therefore 10ag = \frac{3g}{2a} (c_1^2 - 16a^2) \quad (5)$$

$$20a^2 = 3c_1^2 - 48a^2$$

$$\therefore c_1^2 = \frac{68}{3} a^2$$

$$\therefore c_1 = \sqrt{\frac{68}{3}} a. \quad (5)$$


$$\therefore \text{මෙම සරල අනුවර්තී චලිතයෙහි විස්තාරය} = \sqrt{\frac{68}{3}} a.$$

15

$$C \text{ වෙත } C \text{ වෙත } D \text{ ගමන් කළ කාලය} = t_1 = \frac{1}{4} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2} \cdot \sqrt{\frac{2a}{5g}}$$

(5)


$$C \text{ සිට } D \text{ දක්වා ගමන් කළ කාලය} = t_2$$



(5)

$$\omega_1 t_2 = \theta = \sin^{-1} \left(\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{68}} \right)$$

(5)



$$\therefore t_2 = \sqrt{\frac{2a}{3g}} \sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{17}} \right)$$

(5)

$$D \text{ හිදී වේගය} = \omega_1 c_1$$

(5)

$$D \text{ සිට } A \text{ දක්වා ගමන් කළ කාලය} = t_3 = \frac{2a}{\omega_1 c_1} = 2a \sqrt{\frac{2a}{3g}} \cdot \sqrt{\frac{3}{68}} \cdot \frac{1}{a}$$

(5)

$$\frac{68a^2}{3} = 16a^2 + k^2$$

$$\frac{20a^2}{3} = k^2$$

$$k = 2\sqrt{\frac{5}{3}} a$$

$$\cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{68}}$$


$$\therefore \text{අවසාන කාලය} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2a}{5g}} + \sqrt{\frac{2a}{3g}} \sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{17}} \right) + \sqrt{\frac{2a}{17g}}$$

(5)


14.(a) O මූලය අනුබද්ධයෙන් A හා B ලක්ෂ්‍ය දෙකක පිහිටුවී දෛශික පිළිවෙළින්, සූත්‍රාලය අංකනයෙන්, $\mathbf{a} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$ හා $\mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ යැයි ගනිමු. C යනු $\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OB}$ වන පරිදි වූ ලක්ෂ්‍යය යැයි ගනිමු. තවද, D යනු DC, AB ට සමාන්තර හා AD, AB ට ලම්භ වන පරිදි වූ ලක්ෂ්‍යය යැයි ගනිමු. $\overrightarrow{OD} = -\frac{8}{5}\mathbf{i} + \frac{11}{5}\mathbf{j}$ බව පෙන්වන්න. AB හා OD හි ඡේදන ලක්ෂ්‍යය E යැයි ගනිමු.

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{10}\overrightarrow{AB} \text{ බව පෙන්වන්න.}$$

(b) $\angle BAD = \angle BDC = \frac{\pi}{2}$, $AB = AD = 2\sqrt{2}a$ හා $CD = 3a$ වූ $ABCD$ කල වතුරසුයක් රූපයෙහි දැක්වේ. විශාලත්ව $3P, 3P, 2\sqrt{2}P, 5\sqrt{2}P$ හා $3\sqrt{2}P$ වූ බල පිළිවෙළින් AB, AD, BD, BC හා DC දිගේ අක්ෂර අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන දිශාවලට ක්‍රියා කරයි. මෙම බල පද්ධතිය, විශාලත්ව αP හා βP වූ පිළිවෙළින් AB හා AD දිගේ අක්ෂර අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන දිශාවලට ක්‍රියාකරන බල දෙකකට හා වාමාවර්ත අතට ක්‍රියාකරන සූර්යය M වූ බල යුග්මයකට තුල්‍ය වේ. α, β හා M හි අගයන් සොයන්න. දැන්, ඉහත බල පද්ධතියට, වතුරසුයේ තලයෙහි ක්‍රියාකරන බල යුග්මයක් එකතු කරනු ලබන්නේ නව බල පද්ධතියේ සම්ප්‍රසුක්තය D හරහා යන පරිදි ය. එකතු කළ බල යුග්මයේ සූර්යය සොයන්න.



(a)



$$\underline{c} = \overrightarrow{OC} \text{ හා } \underline{d} = \overrightarrow{OD} \text{ යැයි ගනිමු.}$$

DC, AB ට සමාන්තර බැවින්,

$$\overrightarrow{DC} = \lambda \overrightarrow{AB}; \text{ මෙහි } \lambda \text{ යනු අදිශයකි.} \quad (5)$$

$$\underline{c} - \underline{d} = \lambda(\underline{b} - \underline{a}) \quad (5)$$

$$\therefore \underline{d} = 2\underline{b} - \lambda(\underline{i} + 2\underline{j} + \underline{i} - \underline{j})$$

$$\overrightarrow{OD} = 2\underline{i} + 4\underline{j} - \lambda(2\underline{i} + \underline{j}) \text{ ----- (1)} \quad (5)$$

$$\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OB}$$

$$= 2\underline{b}$$

$$= 2(\underline{i} + \underline{j})$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}$$

$$= \underline{i} - \underline{j} + \underline{i} + 2\underline{j}$$

$$= 2\underline{i} + \underline{j}$$

$AD \perp AB$ බැවින්,

$$\vec{AD} \cdot \vec{AB} = 0. \quad (5)$$

$$\vec{OD} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

$$[2\vec{i} + 4\vec{j} - \lambda(2\vec{i} + \vec{j}) + \vec{i} - \vec{j}] \cdot (2\vec{i} + \vec{j}) = 0 \quad (5)$$

$$\vec{OD} = \vec{OB}$$

$$[(3-2\lambda)\vec{i} + (3-\lambda)\vec{j}] \cdot (2\vec{i} + \vec{j}) = 0$$

$$x\vec{i} + y\vec{j} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - \lambda(2\vec{i} + \vec{j}) \quad 6 - 4\lambda + 3 - \lambda = 0$$

$$x = 2 - 2\lambda \quad y = 4 - \lambda$$

$$\therefore \lambda = \frac{9}{5} \quad (5)$$

$$\vec{AD} = \vec{AO} + \vec{OD}$$

$$= x\vec{i} + y\vec{j} + \vec{i} - \vec{j}$$

$$\text{එනම්, (1)} \Rightarrow \vec{OD} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - \frac{9}{5}(2\vec{i} + \vec{j}) \quad (5)$$

$$= (x+1)\vec{i} + (y-1)\vec{j}$$

$$= \left(2 - \frac{18}{5}\right)\vec{i} + \left(4 - \frac{9}{5}\right)\vec{j}$$

$$= -\frac{8}{5}\vec{i} + \frac{11}{5}\vec{j} \quad (5)$$

$$\vec{AD} \cdot \vec{AB} = 0$$

$$\{(x+1)\vec{i} + (y-1)\vec{j}\} \cdot (2\vec{i} + \vec{j}) = 0$$

$$2(x+1) + (y-1) = 0$$

$$2x + y = -1$$

$$\lambda = \frac{9}{5}$$

40

$$\vec{AE} = \mu(\vec{AB}); \text{ මෙහි } \mu \text{ යනු අභිලාසකි.} \quad (5)$$

$$\vec{OE} - \vec{OA} = \mu(2\vec{i} + \vec{j})$$

$$\frac{1}{2}\vec{OD} - \vec{OA} = \mu(2\vec{i} + \vec{j}) \quad (5)$$

$$\frac{1}{2}\left(-\frac{8}{5}\vec{i} + \frac{11}{5}\vec{j}\right) - (-\vec{i} + \vec{j}) = \mu(2\vec{i} + \vec{j})$$

$$-\frac{8}{10}\vec{i} + \frac{11}{10}\vec{j} + \vec{i} - \vec{j} = \mu(2\vec{i} + \vec{j})$$

$$\frac{2}{10}\vec{i} + \frac{1}{10}\vec{j} = \mu(2\vec{i} + \vec{j}) \quad (5)$$

$$\therefore \mu = \frac{1}{10} \quad (5)$$

$$\therefore \vec{AE} = \frac{1}{10}\vec{AB}.$$

$$\vec{OE} = \mu(2\vec{i} + \vec{j}) - \vec{i} + \vec{j}$$


$$\vec{OE} = k\vec{OD}$$

$$\vec{OE} = k\left[-\frac{8}{5}\vec{i} + \frac{11}{5}\vec{j}\right]$$

$$(2\mu - 1) = -\frac{8k}{5}$$

$$(2\mu + 1) = \frac{11k}{5}$$

20



$$\sin \theta = \frac{a}{5\sqrt{2}a} = \frac{1}{5\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{in}} = \frac{a}{\sqrt{2} 5a} = \frac{1}{5\sqrt{2}}$$

$$BD = \sqrt{8a^2 + 8a^2} = 4a$$

$$BC = 5a$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{4}{5} \\ \sin \alpha &= \frac{3}{5} \end{aligned} \right\} \textcircled{5}$$

$$\uparrow \beta P = 3P + 2\sqrt{2}P \sin \frac{\pi}{4} + 3\sqrt{2}P \cos \frac{\pi}{4} + 5\sqrt{2}P \sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \quad (10) \quad \text{ද. පැ. සඳහා}$$

$$= 3P + 2P + 3P + 5\sqrt{2}P \left\{ \sin \frac{\pi}{4} \cos \alpha + \cos \frac{\pi}{4} \sin \alpha \right\} \quad (5)$$

$$= 8P + 5\sqrt{2}P \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{4}{5} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{5} \right\} \quad (5)$$

$$= 15P.$$

$$\therefore \beta = 15 \quad (5)$$

$$\rightarrow \alpha P = 3P - 2\sqrt{2}P \cos \frac{\pi}{4} + 3\sqrt{2}P \cos \frac{\pi}{4} - 5\sqrt{2}P \cos \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \quad (10) \quad \text{ද. පැ. සඳහා}$$

$$= 3P - 2P + 3P - 5\sqrt{2}P \left\{ \cos \frac{\pi}{4} \cos \alpha - \sin \frac{\pi}{4} \sin \alpha \right\} \quad (5)$$

$$= 4P - 5\sqrt{2}P \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{4}{5} - \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{5} \right\} \quad (5)$$

$$= 3P.$$

$$\therefore \alpha = 3. \quad (5)$$

$$M = -3\sqrt{2}P \cos \frac{\pi}{4} \times 2\sqrt{2}a + 2\sqrt{2}P \sin \frac{\pi}{4} \times 2\sqrt{2}a + 5\sqrt{2}P \sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \times 2\sqrt{2}a \quad (15)$$

$$= 2\sqrt{2}a\{-3P + 2P + 7P\}$$


$$= 12\sqrt{2}Pa. \quad (5)$$

ඔබේ ① ② ③ } ද. ප. සඳහා
 ඔබේ ④ ⑤ ⑥ } අනුකර්තයා

75

$$B = 31 \times 2\sqrt{2}a + 3\sqrt{2}1 \times 4a - 151 \times 2\sqrt{2}a$$


එකතු කළ යුත්තේයයි ස්ථරයේ M_1 යැයි ගනිමු.




$$\Rightarrow 3P \times 2\sqrt{2}a + 12\sqrt{2}Pa - M_1 = 0 \quad (10)$$

$$\therefore M_1 = 18\sqrt{2}Pa. \quad (5)$$

15




15. (a) $4a$ සමාන දිගින් යුත් හා බර පිළිවෙළින් $W, 2W$ හා W වන AB, BC හා CD ඒකාකාර දඬු තුනක් B හා C අන්තවලදී සුමට ලෙස සන්ධි කර ඇත. A කෙළවර අවල ලක්ෂ්‍යයකට සුමට ලෙස අසව් කර ඇත. සැහැල්ලු අවිනාශ තත්ත්වයක් එක් කෙළවරක් B සන්ධියට ඇඳා ඇති අතර තත්ත්වයේ අනෙක් කෙළවර, තිරස් සිව්වලින් මත B ට සිරස්ව ඉහළින් වූ ලක්ෂ්‍යයකට ඇඳා ඇත. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, AB හා CD දඬු එක සිරස් සමග 60° ක කෝණයක් ද BC දණ්ඩ සිරස් සමග 30° ක කෝණයක් ද සාදමින් හා තත්ත්වය තදව ඇතිව දඬු තුන සිරස් තලයක සමතුලිතව තබා ඇත්තේ $BE = 3a$ වන පරිදි E හි ඇති අවල සුමට නාදැත්තක් මත BC දණ්ඩ තැබීමෙන් හා, D හිදී විශාලත්වය P වූ තිරස් බලයක් යෙදීමෙනි.




- P හි අගය සොයන්න.
- නාදැත්ත මගින් BC දණ්ඩ මත ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාවේ විශාලත්වය $\frac{W}{3}$ බව පෙන්වන්න.
- තත්ත්වයේ ආතතිය සොයන්න.

(b) රූපයේ පෙන්වා ඇති රාමු සැකිල්ල, අන්තවලදී සුමට ලෙස සන්ධි කළ AB, BC, CD, DA හා DB සැහැල්ලු දඬු පහකින් සමන්විත වේ. $AB = AD = 2a, BC = BD = 2\sqrt{3}a$ හා $\angle CBD = \frac{\pi}{2}$ බව දී ඇත. C සන්ධියේදී W බරක් එල්ලා, රාමු සැකිල්ල A හිදී අවල ලක්ෂ්‍යයකට සුමටව අසව් කර, BC තිරස්ව ඇතිව සිරස් තලයක සමතුලිතව තබා ඇත්තේ D සන්ධියේදී සිරස්ව උඩු අතට යෙදූ විශාලත්වය P වූ බලයක් මගිනි. බෝ අංකනය භාවිතයෙන් C, B හා D සන්ධි සඳහා ප්‍රත්‍යාවල සටහනක් අඳින්න. ඒ නමින්, දඬුවල ප්‍රත්‍යාවල, ආතති ද තෙරපුම් ද යන්න සඳහන් කරමින් සොයන්න.



(a)



(i) $\curvearrowright CD$ සඳහා : $W \times 2a \sin 60^\circ - P \times 4a \cos 60^\circ = 0$. (10)

$$\sqrt{3}W - 2P = 0$$

$$\therefore P = \frac{\sqrt{3}}{2}W.$$
 (5)

15

(ii) B \ BC හා CD සඳහා :

එන වරදකට (5)
වරදවල් දෙකකට (10)

$$2W \times 2a \sin 30^\circ + W(4a \sin 30^\circ + 2a \sin 60^\circ) - R \times 3a - P \times (4a \cos 30^\circ + 4a \cos 60^\circ) = 0.$$

(15)

$$2W + W(2 + \sqrt{3}) - 3R - \frac{\sqrt{3}}{2}W(2\sqrt{3} + 2) = 0. \quad (5)$$

$$\therefore 3R = 2W + 2W + \sqrt{3}W - 3W - \sqrt{3}W$$

$$\therefore R = \frac{W}{3}. \quad (5)$$

25

(iii) A \ පද්ධතිය සඳහා :

වරද 1 කට (-5)

වරද 2 කට (-10)

$$W \times 2a \sin 60^\circ + 2W(4a \sin 60^\circ + 2a \sin 30^\circ) +$$

$$W(4a \sin 60^\circ + 4a \sin 30^\circ + 2a \sin 60^\circ) - P(4a \cos 30^\circ + 4a \cos 60^\circ - 4a \cos 60^\circ) -$$


$$R \times 3a - T \times 4a \sin 60^\circ = 0. \quad (20)$$

$$\therefore T \times 2\sqrt{3} = W \times \sqrt{3} + 2W(2\sqrt{3} + 1) + W(3\sqrt{3} + 2) - \frac{\sqrt{3}W}{2}(2\sqrt{3}) - \frac{W}{3} \times 3 \quad (5)$$


$$= 8\sqrt{3}W$$

$$\therefore T = 4W. \quad (5)$$

30



(b)



දණ්ඩ	විශාලත්වය	ආතතිය/තෙරපුම
BC	W (5)	තෙරපුම (5)
CD	$\sqrt{2}W$ (5)	ආතතිය (5)
BD	$\sqrt{3}W$ (5)	ආතතිය (5)
AB	$2W$ (5)	තෙරපුම (5)
AD	$2W$ (5)	ආතතිය (5)

50

එක සන්ධිකව

(10) × 3

80


සන්ධි දෙකම ඇදලා නව

(-5)


ආතති තෙරපුම
 CD ($\sqrt{2}W$) BC (W)
 BD ($\sqrt{3}W$) AB ($2W$)
 AD ($2W$)

16. අරය a වූ ඒකාකාර අර්ධගෝලාකාර කබොලක් ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය එහි කේන්ද්‍රයේ සිට $\frac{a}{2}$ දුරකින් ද, උස h වූ ඝන ඒකාකාර කැපු-වෘත්තාකාර කේතුවක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය, එහි පතුලේ කේන්ද්‍රයේ සිට $\frac{h}{4}$ දුරකින් ද පිහිටන බව පෙන්වන්න.



උස $2a$ වූ ඡිත්තකයක් සාදා ඇත්තේ, පතුලේ අරය $3a$ හා උස $3a$ වන ඝන ඒකාකාර කැපු-වෘත්තාකාර කේතුවකින්, එහි පතුලට සමාන්තර කලයක් හරහා කපා, කුඩා කැපු-වෘත්තාකාර කේතුව ඉවත් කිරීමෙනි. (යාබද රූපය බලන්න). ඡිත්තකය සෑදීම සඳහා ඉවත් කළ කැපු-වෘත්තාකාර කේතුවේ ස්කන්ධය m වේ. ඡිත්තකයේ ස්කන්ධය $26m$ බව පෙන්වන්න.



අරය a හා ස්කන්ධය m වූ ඒකාකාර අර්ධගෝලාකාර කබොලක් හා ඉහත ඡිත්තකය, දිග λa හා ස්කන්ධය m වන ඒකාකාර දණ්ඩක අන්තර්ලංච දෘඪ ලෙස සවි කර, යාබද රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, සංයුක්ත වස්තුවක් සාදා ඇත්තේ, දණ්ඩක්, අර්ධගෝලාකාර කබොලේ කේන්ද්‍රයත්, ඡිත්තකයේ අක්ෂයත් යන සියල්ල එකම සරල රේඛාවක පිහිටන පරිදි ය. සංයුක්ත වස්තුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය, ඡිත්තකයේ විශාල වෘත්තාකාර පතුලේ කේන්ද්‍රයේ සිට $\frac{3}{56}(15 + \lambda)a$ දුරකින් පිහිටන බව පෙන්වන්න.



සංයුක්ත වස්තුව, තිරස් මේසයක් මත, ඡිත්තකයේ වක්‍ර වෘත්තය මේසය ස්පර්ශ කරමින් තබා ඇත. සංයුක්ත වස්තුවේ සමමිතික අක්ෂය හරහා සිරස් හරස්කඩ යාබද රූපයේ දැක්වේ. සංයුක්ත වස්තුව සමතුලිතතාවේ පවතී නම්, $\lambda \leq \frac{11}{3}$ බව පෙන්වන්න.



පෘෂ්ඨය $2\pi a^2 \sin \theta d\theta$

(5) + (5)

සීමාව වැරදි වුව (10) නම් නැ


සමමිතියෙන්, ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය G , x -අක්ෂය මත පිහිටයි.

$OG = \bar{x}$ යැයි ගනිමු. (5)

$$\bar{x} = \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi a \sin \theta \cdot a \cos \theta \cdot \sin \theta d\theta}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi a \sin \theta d\theta} \quad (5)$$

$$= \frac{a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta}$$

$$= \frac{a \left[\frac{\sin^3 \theta}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}}{\left[-\cos \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}}} = \frac{a}{2} \quad (5)$$



සමමිතියෙන්, ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය G , x - අක්ෂය මත පිහිටයි. (5)

$OG = \bar{x}$ යැයි ගනිමු.

$$\frac{r}{a} = \frac{x}{h}$$

$$\bar{x} = \frac{\int_0^h \pi \left(\frac{ax}{h} \right)^2 x \rho dx}{\int_0^h \pi \left(\frac{ax}{h} \right)^2 \rho dx} \quad (5)$$

$$= \frac{\int_0^h x^3 dx}{\int_0^h x^2 dx}$$

$$= \frac{\left[\frac{x^4}{4} \right]_0^h}{\left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h} = \frac{3h}{4} \quad (5)$$


$\therefore$ පතුලෙහි කේන්ද්‍රයේ සිට G ට ඇති දුර $= h - \frac{3h}{4}$

$$= \frac{h}{4} \quad (5)$$

30

(5) $m = \frac{1}{3} \pi a^2 \cdot \rho h$; මෙහි ρ යනු සන්නිවේදය වේ.

$$\begin{aligned} \text{පිත්තකයෙහි ස්කන්ධය} &= \frac{1}{3} \pi (3a)^2 \cdot 3a \rho - m \quad (5) \\ &= 27m - m \\ &= 26m. \quad (5) \end{aligned}$$




15

සමමිතියෙන්, S සංයුක්ත වස්තුවෙහි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සමමිතික අක්ෂය මත පිහිටයි.

$OG = \bar{x}$ යැයි ගනිමු.

5



වස්තුව	ස්කන්ධය	ස්.කේ. ව O සිට දුර
	$27m$ 5	$\frac{3a}{4}$ 5
	m	$2a + \frac{a}{4}$ 5
	m	$2a + \frac{\lambda a}{2}$ 5
	m	$2a + \lambda a + \frac{a}{2}$ 10
S	$28m$ 5	$\bar{x}$



$26m$ $\frac{9a}{13}$

$\frac{9a}{4}$

$\frac{5a}{2} + \lambda a$

$$28m \bar{x} = 27m \times \frac{3a}{4} - m \left(2a + \frac{a}{4} \right) + m \left(2a + \frac{\lambda a}{2} \right) + m \left(2a + \lambda a + \frac{a}{2} \right) \quad (10) \text{ or } 0$$

$$28\bar{x} = \frac{81}{4}a - \frac{9a}{4} + \left(2 + \frac{\lambda}{2} \right)a + \left(\frac{5}{2} + \lambda \right)a$$

$$= \frac{72}{4}a + \frac{9a}{2} + \frac{3\lambda}{2}a$$


$$= \frac{90a}{4} + \frac{3\lambda}{2}a$$

$$\therefore \bar{x} = \frac{3}{56}(15 + \lambda)a \quad (10)$$

60

චිත්‍රාකෘති ගැලපීමට තෝරන්න

10



සමතුලිතතාව සඳහා, $OG \leq OA$.

5

$$\widehat{BCD} = \frac{3\pi}{4}.$$

$$\therefore \alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore AB = a.$$

$$\therefore OA = 2a - a = a.$$

5

$$\therefore \frac{3}{56}(15+\lambda)a \leq a$$

$$\therefore 45 + 3\lambda \leq 56$$

$$\therefore \lambda \leq \frac{11}{3}.$$

5

15

17.(a) C පෙට්ටියක කර පාට බෝල 2 ක් හා සුදු පාට බෝල 2 ක් අඩංගු වන අතර, D පෙට්ටියක කර පාට බෝල 2 ක් හා සුදු පාට බෝල 1 ක් අඩංගු වේ. මෙම බෝල, පාවිත් හැර අන් හැම අයුරකින්ම සමාන වේ. පළමුව, C පෙට්ටියෙන් එක බෝලයක් සසම්භාවී ලෙස D පෙට්ටිය තුළට මාරු කරනු ලැබේ. පසුව, D පෙට්ටියෙන් එක බෝලයක් සසම්භාවී ලෙස C පෙට්ටිය තුළට මාරු කරනු ලැබේ. දැන්, D පෙට්ටියෙන් සසම්භාවී ලෙස බෝලයක් ඉවතට ගනු ලැබේ.

(i) D පෙට්ටියෙන් ඉවතට ගත් බෝලය සුදු පාට එකක් වීමේ,

(ii) D පෙට්ටියෙන් ඉවතට ගත් බෝලය සුදු පාට එකක් බව දී ඇති විට, පළමුව C පෙට්ටියෙන් D පෙට්ටියට මාරු කළ බෝලය කර පාට එකක් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.


(b) බැංකුවක පාරිභෝගිකයින් 100 දෙනෙකුගේ වාර්ෂික ඉතුරුම්වල දත්ත ව්‍යාප්තිය පහත වගුවෙන් දෙයි.

ඉතුරුම්, රුපියල් දහස්වලින්	සංඛ්‍යාතය
10 - 30	35
30 - 50	40
50 - 70	15
70 - 90	10

ඉහත දත්ත ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යන්‍යය, මධ්‍යස්ථය, මාතය හා විචලනාවය සොයන්න.


දැන්, අමතර පාරිභෝගිකයින් x සංඛ්‍යාවක් දත්ත ව්‍යාප්තියට එකතු කරන අතර ඒ සියලුදෙනා තනි පන්ති ප්‍රාන්තරයකට අයත් වන බව සොයාගන්නා ලදී. පාරිභෝගිකයින් $(100 + x)$ දෙනාගේ වාර්ෂික ඉතුරුම්වල මධ්‍යන්‍යය රු. 40 000 බව දී ඇත. නව පාරිභෝගිකයින් x දෙනා අයත් වන පන්ති ප්‍රාන්තරය 30 - 50 බව පෙන්වන්න.

(a) (i)



i)



$$\frac{2C_1 \times 2C_1 \times 1 + 2C_1 \times 3C_1 \times 1 + 2C_1 \times 2C_1 \times 2C_1}{4C_1 \times 4C_1 \times 3C_1}$$



$$\frac{4 + 6 + 8}{48} = \frac{3}{8}$$

ii)

$$\frac{2C_1 \times 3C_1 \times 1}{3/8} = \frac{1}{3}$$



$X : D$ වලින් ඉවතට ගත් බෝලය සුදු පාට එකක් වීම.

$$\begin{aligned}
 P(X) &= P(X \cap E_1) + P(X \cap E_2) + P(X \cap E_3) + P(X \cap E_4) \\
 &= P(X|E_1) \cdot P(E_1) + P(X|E_2) \cdot P(E_2) + P(X|E_3) \cdot P(E_3) + P(X|E_4) \cdot P(E_4) \\
 &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} + 0 + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\
 &\quad \textcircled{10} \quad \textcircled{10} \quad \textcircled{10} \\
 &= \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \\
 &= \frac{3}{8} \quad \textcircled{5}
 \end{aligned}$$

35

(ii)

$Y : C$ වලින් D ව මාරු කළ බෝලය කළු පාට එකක් වීම.

$$\begin{aligned}
 P(Y|X) &= \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} & P(X|Y) &= \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \\
 &= \frac{P(X|Y) \cdot P(Y)}{P(X)} & P(Y) &= \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}}{\frac{3}{8}} \quad \textcircled{10} \quad \textcircled{5} \\
 &= \frac{1}{3} \quad \textcircled{5}
 \end{aligned}$$

$\frac{3}{8}$ නැතිව වෙන අගයන්
 නිසා නොමැත් $\frac{15}{20}$ නි

20

(h)

පන්ති ප්‍රාන්තරය	f_i	x_i	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
10 - 30	35	20	700	14000
30 - 50	40	40	1600	64000
50 - 70	15	60	900	54000
70 - 90	10	80	800	64000
	100		4000	196000

★ වගුවෙන්
උපරිමය

(20)

$$\text{මධ්‍යන්‍යය } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^4 f_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^4 f_i} = \frac{4000}{100} = 40 \text{ (දහස් වලින්)}$$

මධ්‍යස්ථ පන්තිය = 30 - 50.

$$\text{මධ්‍යස්ථය} = 30 + \frac{\left(\frac{100}{2} - 35\right)}{40} \cdot 20 = 37.5 \text{ (දහස් වලින්)}$$

මාත පන්තිය = 30 - 50.

$$\begin{aligned} \text{මාතය} &= L + \frac{\Delta_1}{(\Delta_1 + \Delta_2)} \cdot c = 30 + \frac{5}{(5+25)} \cdot 20 \\ &= 30 + \frac{10}{3} \approx 33.333 \text{ (දහස් වලින්)} \end{aligned}$$

$$\text{විචලකාව} = \frac{\sum f_i x_i^2}{\sum f_i} - \bar{x}^2$$

$$= \frac{196000}{100} - 40^2$$

$$= 1960 - 1600$$

$$= 360 \text{ ((දහස්)}^2 \text{ වලින්)}$$

වරදට අනුව

75

d යනු නව x පාරිභෝගිකයන් එකතු කරන ලද පංති ප්‍රාන්තරයෙහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය යයි ගනිමු.

නව මධ්‍යන්‍යය 40 (දහස් වලින්) බැවින්

$$(100+x)40 = d \cdot x + 40 \times 100 \quad (10)$$

$$\therefore d = 40. \quad (5)$$

මධ්‍යන්‍යය වෙනස්
නොවන බැවින්
නිසා ලියා ඇති විට
ප්‍රමාණ වේ.

$\therefore$ නව පාරිභෝගිකයින් අයත් වන පන්ති ප්‍රාන්තරය 30-50. (5)

20

	x_i	f_i	y_i	$f_i y_i$	$f_i y_i^2$
10-30	20	35	-1	-35	35
30-50	40	40	0	0	0
50-70	60	15	1	15	15
70-90	80	10	2	20	40
		$\sum_{i=1}^n f_i = 100$		$\sum_{i=1}^n f_i y_i = 0$	$\sum_{i=1}^n f_i y_i^2 = 90$

$$y_i = \frac{x_i - 40}{20}$$

$$S_y^2 = \frac{S_x^2}{20^2}$$

$$\overline{y} = \frac{\overline{x} - 40}{20}$$

$$\frac{90}{100} \times 400 = S_x^2$$

$$0 = \frac{\overline{x} - 40}{20}$$

$$360 = S_x^2$$

$$\overline{x} = 40$$